

Beiträge  
zur  
Geschichte  
der  
Insekten

---

Herausgegeben

von

D. Georg Wolfgang Franz Panzer

der Reichsstadt Nürnberg ordentlichem Physikus, der Kais. Akademie der Naturforscher,  
des Königl. Preuss. Instituts zu Erlangen, der Akademie der Wissenschaften zu Erfurt,  
der Churfürstl. Pfalz-bayerischen Societät sittlicher und landwirthschaftlicher Wissenschaften  
zu Burghausen, der naturhistorischen Societät zu Paris, Danzig, Jena, Göttingen,  
der naturforschenden Freunde zu Berlin, der phytographischen zu Göttingen, der botanischen  
Gesellschaft zu Regensburg, und des teutschen Pegnischen Blumenordens zu Nürnberg ic. Mitglied.

---

Mit zwölf Kupfertafeln.

---

Erlangen  
bey Johann Jakob Palm. 1802.

Johann Euseb Voets  
Beschreibungen und Abbildungen  
hartschaaliger  
Insekten  
COLEOPTERA LINN.

---

Aus dem Original getreu übersezt  
mit der  
in selbigem fehlenden Synonymie und beständigem Commentar  
versehen  
von

D. Georg Wolfgang Franz Panzer

der Reichsstadt Nürnberg ordentlichem Physikus, der Kais. Akademie der Naturforscher,  
des Königl. Preuß. Instituts zu Erlangen, der Akademie der Wissenschaften zu Erfurt,  
der Churfürstl. Pfalz-bayerischen Societät sittlicher und landwirthschaftlicher Wissenschaften  
zu Burghausen, der naturhistorischen Societät zu Paris, Danzig, Jena, Göttingen,  
der naturforschenden Freunde zu Berlin, der phytographischen zu Göttingen, der bota-  
nischen Gesellschaft zu Regensburg, und des teutschen Pegnesischen Blumen-  
ordens zu Nürnberg u. Mitglied.

---

Fünfter Theil.  
Mit zwölf Kupfertafeln.

---

Erlangen  
bey Johann Jakob Palm. 1802.

---

## V o r b e r i c h t.

---

Diese gegenwärtigen Beyträge zur Geschichte der Insekten, sind die Frucht einer frühern Idee, zu welcher Herr Bischoff in Nürnberg, der damals, als Künstler und Verleger meine deutsche Ausgabe des Voetschen Käfertwerkes besorgte, größtentheils die Veranlassung gegeben, weil diese Beyträge 2c. auch als Fortsetzung, dieses Werkes angesehen werden sollten. Doch diese Idee ist nur zu sehr unausgeführt geblieben. Nicht sowohl, weil seitdem auch diese Kupfertafeln, der Verlags-handlung des Herrn Palm in Erlangen überlassen worden, sondern weil vielmehr, die Uebnahme eines Civilamtes Herrn Bischoff außer allen Stand setzte, seine mit veranlaßte Idee, zu einer Reise zu bringen, die ich, unter andern Umständen selbst gewünscht hatte. Verschiedene Ereignisse trafen indessen zusammen, welche der Ausarbeitung des Textes nicht günstig

## V o r b e r i c h t.

waren, und der inzwischen dahin geschwundene Zeitraum, mußte nothwendig, den abgebildeten Gegenständen, den Werth der Neuheit vollends rauben, den sie vor mehreren Jahren gehabt haben.

Um nun diese gewiß sehr gut ausgeführte Kupfertafeln nicht vollends zu unterdrücken, entschloß ich mich endlich, den hiezu gehörigen Text zu bearbeiten, und bey der Beschreibung, der auf denselben zur Sprache gebrachten Gegenstände, eine Sorgfalt und Genauigkeit zu beobachten, die wenigstens nur einigermaßen, die Freunde dieses Werkes, für die mindere Neuheit der vorgestellten Insektenarten, schadlos halten sollte.

Eine Fortsetzung dieses Werkes, nach diesem, wie ich selbst gestehe, nicht sehr ökonomisch angelegten Plane, ist nun unter ganz veränderten Umständen kaum zu erwarten.

---

P a n z e r.

LVCA-



IOANNIS EVSEBII VOETII  
ICONES ET DESCRIPTIONES  
COLEOPTERORVM

---

EDITORE

D. GEORGIO WOLFGANGO FRANCISCO PANZER

REIPVBL. NORIMBERGENS. PHYSICO ORDINARIO ACADEM. IMPERIAL. NAT. CVRIOS. ACAD. SCIENT. ERFORDENS. SOCIET. HISTOR. NATVR. PARIS. BEROLINENS. DANTISC. IENENS. GOETTINGENS. BVRGHVS. PHYTOGRAPHIC. GOETTINGENS. BOTAN. RATISBONENS. ET FLORIGERAE AD PEGNES. NORIMBERG. SOCIO.

---

TOMVS QVINTVS.  
CVM TABVLIS XII AENEIS.

---

ERLANGAE  
IMPENSIS IOANNIS IACOBI PALM.  
1802.

SYMBOLAE  
ENTOMOLOGICAE

---

AUCTORE

D. GEORGIO WOLFGANGO FRANCISCO PANZER

REIPVBL. NORIMBERGENS. PHYSICO ORDINARIO ACADEM. IMPERIAL. NAT. CVRIOS. ACAD. SCIENT. ERFORDENS. SOCIET. HISTOR. NATVR. PARIS. BEROLINENS. DANTISC. IENENS. GOETTINGENS. BYRGHVS. PHYTOGRAPHIC. GOETTINGENS. BOTAN. RATISBONENS. ET FLORIGERAE AD PEGNES. NORIMBERG. SOCIO.

---

CVM TABVLIS XII AENEIS.

---

ERLANGAE  
IMPENSIS IOANNIS IACOBI PALM.  
1802.

L.

B.

S.

Vt ederem symbolas has entomologicas, ante plures et quod excurrit annos, *Valentin. Bischoff* pictor et chalcographus Norimbergae - Francorum, haud incelebris, primus suasor fuit, qui annis 1785 - 1791 *Voetii Coleoptera*, germanico idiomate a me in lucem emissa publicum, impensis suis curabat; quoniam symbolis meis entomologicis *Voetii* opus cogitabat continuare. Verum quae in animo habebat, haud ita prospere succedebant. *Bischoffius* enim munere nunc civili sibi demandato occupatus, neque aliorum neque meis commoveri poterat precibus, ut infectis pluribus delineandis atque in aes iis incidendis aliquot impenderet temporis: quo facto, ut et ego propositum nostrum in medio relinquere coactus fuerim. Haud exiguo interim temporis praeter-

lapso spatio, evenit, ut multarum rerum morae obtemperandum fuisset, quae adumbrationem tabularum interim excusarum citra etiam meam expectationem redardabat.

Ne itaque in omne fere tempus supprimerentur hae tabulae, tandem manus admovi ultimas, operamque sedulo dedi, ut omni, qua par sim, industria, insecta in iis depicta adumbrarem describeremque, sperans atque confidens fore, ut opella hac mea, faltem scientiae accederet symbolum exiguum. Dabam  
d. 16. Aug. 1802.

# LVCANVS CAPREOLVS.

## Der Rehschröter.

Tab. I. Fig. 1. 2. 3. 4. Mas. Fig. 5. 6. 7. 8. Femina.

LVCANVS *Capreolus* scutellatus: maxillis exsertis apice tantum furcatis. LINN.  
Syst. Nat. n. 2. p. 560. edit. XII. holm. ed. XIII. GMEL. T. I. P. IV. n. 2.  
p. 1589.

LVCANVS *Capreolus* maxillofus: maxillis exsertis apice tantum furcatis. *Amm.*  
*Acad.* Vol. VI. n. 4. p. 391. \*

SCARABAEVS *Capreolus* maxillofus: maxillis exsertis apice tantum bifurcatis.  
*Mus. Lud. Vr.* n. 30. p. 32. \*


GOEZE Beytr. I Th. n. 2. p. 121.

LVCANVS *Capreolus* mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga  
transversa elevata interrupta. FABRIC. Syst. Ent. n. 4. p. 2. Spec. Inf.  
T. I. n. 4. p. 2. Mantiss. Insect. T. I. n. 4. p. 1. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 4.  
p. 237.

LVCANVS fusco - castaneus, femoribus flavis, maxillis maximis corniformibus,  
apice simplicibus, latere unidentatis. DEGEER Inf. Tom. IV. p. 336. n. 1.  
tab. 19. fig. II. 12.

LVCANVS *Capreolus*. HERBST Naturg. tab. XXIV. fig. 2. 3.





<i>Mensurae.</i>		<i>Mas.</i>	<i>Femina.</i>
		lin. 15	lin. 15½
	Longitudo a capite ad anum		
	mandibulae	3	2
	capitis	3	2½
	thoracis	3	3½
	elytri	9	9½
Latitudo	elytrorum	6½	7
	capitis	5½	4
	thoracis	5½	6

*Descriptio Maris.* Palpi anteriores posterioribus longiores: articulo extremo clavato, reliquis conicis, primo longissimo. *Mandibulae* arcuatae, apicem versus ramulum sive denticulum introrsum emittentes, reliquum integerrimae. *Maxilla* penicillos constituens duos, medio denticulo armata. *Labium* emarginatum. *Antennae* nigrae in modum Lucanorum fractae, atque compositae ex articulis undecim, quorum quatuor extremi gradatim maioribus lamellis instructi. *Clypeus* caput tegens, fere triangularis est formae, angulis anterioribus parum foveolatus, thoracem versus deliquio transverso insignitus, demum angusto spatio inter mandibulas descendens margine nigro retuso, punctisque vagis plurimis impressus. *Oculi* cinerascetes. *Thorax* septem angulis excisus seu sinuosus, convexus, linea longitudinali obsoleta, deliquio clypei et elytrorum suturae respondentem, et duabus foveolis marginalibus aequae obsoletis instructus, reliquum ut clypeus punctatus. *Scutellum* cordatum exiguum. Margo thoracis anterior et posterior villis rufescentibus cinctus. *Elytra* marginata, angulo antico prominenti, laevia, sed non nisi sub lente punctato striata. *Femora* flava basi et apice macula nigra. *Tibiae anticae* elytris concolores tridentatae: *mediae* sicut *posticae* crebrius et argutius dentatae sunt. Spina femorum omnium notabilis. *Tarsi* articulis quatuor rubicundo-

bicundo - spinulosus instructi, et unguis binis terminati. *Color* elytrorum et mandibularum (excepto earum apice, qui nigrescit), laete castaneus est cum nitore: Clypei et Thoracis autem magis obscurior. *Abdomen* villis canis cinerascens: caeterum laeve, annulis nigro-limbatis.

*Descriptio Feminae.* Eadem conditio palporum ac in mare.

*Mandibulae* minus exsertae arcuatae triquetrae introrsum utroque latere unidentatae, inde sulco percurvae, penitus atrae, relatione maris admodum validae, punctis excavatis plurimis vagis adpersae.

*Maxilla, Labium, Penicilli, Antennae* prorsus ut in mare. *Clypeus* magis accedit ad quadrangularem formam, punctis impressus plurimis, thoracem versus parum laevigatus. *Oculi* albidiores ac in mare. *Thorax* aequè septem, sed obtusioribus angulis sinuosus, emarginatus, convexus, punctis minus excavatus. *Scutellum* vt in mare.

Margo thoracis superior et inferior aequè villo rufo cinctus. *Elytra* ut in mare, nisi quod sint magis colore laetiora. *Femora* itidem ut in mare satis flava. *Tibiae anticae* quadridentatae duplo latiores et validiores ac in mare: *mediae* ut et *posticae* crebrius atque argutius dentatae sunt, cum spina incurva praenotabili. Reliqua descriptioni

maris respondent.

---

Das Männchen des Tab. I. Fig. I. in natürlicher Größe abgebildeten Käfers Schröters ließ nur seine vordern Greifspitzen (Palpi) untersuchen; seine hintern deswegen nicht, weil sie unter der Unterlippe verborgen lagen, welche man ohne das Insect zu beschädigen, nicht füglich ablösen konnte. Aber auch an den vordern konnte man nur drei Gelenke Fig. 2. 3. beobachten: das zweite, welches länger als die übrigen, und wo nicht völlig walzenförmig, doch wenigstens pfriemenförmig, das dritte, das am kürzesten, umgekehrt, kegelförmig, und das




vierte äußerste, das etwas kürzer als das zweite und keulförmig war. Doch zeigte sich der Unterschied der Länge zwischen den vordern und hintern sehr deutlich. Die Oberlippe (Maxilla) verrieth sich durch zweien pinselartige Fortsätze, oder eigentlich durch eben so viele hornartige Spitzen, die völlig mit goldgelben Härchen besetzt sind. Die Unterlippe (Labium) umgab mit ihrer quer aufstehenden Falte die gedachten pinselartigen Fortsätze. Die Kinnladen (Mandibulae) Fig. 2. 3. sind bogig, oder hakenförmig gekrümmt, endigen sich mit einer schwärzlichen ziemlich scharfen Spitze, und lassen in einer mäßigen Entfernung von derselben, noch einen Seitenast oder Seitenzahn hervorbrechen, der ihnen eine so ziemlich gabelförmige Gestalt mittheilt. Außer diesem Seitenzahn, der doch um ein vieles kürzer als die gekrümmte Spitze der Kinnlade ist, besitzen sie sonst gar nichts zahnartiges, sondern sind sowohl auswärts als innwärts glatt: übrigens mit verschiedenen tief eingedrückten Punkten besetzt.

Die Fühlhörner (Antennae) Fig. 2. 3. sind an dem Nieschröter genau also beschaffen, wie man sie dem größten Theile nach an allen Arten dieser Gattung zu bemerken gewohnt ist, und zeichnen sich von jenen des gemeinen Hieschröters (Lucanus Cervus L.) durch nichts besonders, die proportionirte Grösse ausgenommen, aus.

Der Kopfschild *a)* (Clypeus) Fig. 2. stellt so ziemlich die Figur eines ungleichseitigen Vierecks vor, und ist diesennach an seinem vordern Rande wenigstens um zwei Linien breiter als an seinem hintern; an seinen beiden Seitenrändern sich aber der Länge nach gleich. Zwischen den beiden Kinnladen steigt er fast völlig senkrecht abwärts und verliert sich unmittelbar an den pinselartigen Fortsätzen, welchen er gleichsam aufzusitzen scheint. Der Rand ist daselbst sehr merklich erhöht, und schwarz, und bleibt so lange also, bis er wieder zu seinem obern sich wendet. Die Fläche des Kopfschildes ist mehr convex als flach, in der Mitte sogar sehr gewölbt, erhaben, woselbst sich auch eine, zwar nur mäßige, doch sehr sichtbare quer liegende Vertiefung zeigt. Auf einer jeden der beiden obern scharf abgeschnittenen Ecken liegt ein fast dreiseitiges Grübchen, und unter jedem

*a)* Den ich mit dem Namen des Kopfes geradezu zu bezeichnen Bedenken trage, wenn unter demselben schon nicht selten der Kopf selbst, der nur ein geringerer oder vielmehr kleinerer Theil von demselben ist, und von demselben bedeckt wird, verstanden wird.



jedem gerade die erste Gelenkfügung oder die eigentliche Insertion der Fühlhörner. Die Augen, die an dem abschüssigen Seitenrande des Kopfschildes liegen, sind aschgrau, und scheinen so wohl ober- als unterwärts durch ein besonderes Häutgen Fig. 3. 7. in ihrer Lage erhalten zu werden, welches aber nichts anders als ein wahrer Fortsatz des Kopfschildes ist. Uebrigens ist die ganze Fläche des Kopfschildes mit überaus vielen tief eingedrückten Punkten übersät, doch nicht so häufig daselbst, wo sich die gedachten geglätteten Grübchen und Vertiefungen bemerken lassen.

Das Bruststück (Thorax) Fig. 2. ist fast siebeneckigt, und so wie der Kopfschild vornwärts breiter als hinterwärts; gerändert, doch mehr hinterwärts als an den Seiten und vorwärts. Die buchtenartigen Ausschnitte (Sinus) sind sich nicht alle gleich. Seine Fläche ist sehr convex: die Mitte desselben zeichnet sich durch eine besondere vertical streifenartige Vertiefung aus, die in Hinsicht ihrer Lage der gedachten quer liegenden auf dem Kopfschilde, und der nach der Flügeldecken entspricht. An dieser liegen zu beyden Seiten, zwey fast unmerkliche Vertiefungen, und neben diesen, doch etwas mehr abwärts auch zu beyden Seiten nahe an einem tiefen Ausschnitte oder Winkel der Seitenränder ein paar glatte Erhabenheiten, die ich doch nicht Höckerchen nennen möchte. Eingedrückte Punkte zeigen sich hier ebenfalls; doch auf der convexen Mitte nicht in gleicher Anzahl, weswegen man auch eben daselbst eine besondere Glätte wahrnimmt.

Die Flügeldecken (Elytra) Fig. 1. erheben sich rings herum, mit einem sehr merklichen und aufstehenden Rande. Die Basis derselben steht an ihren beyden Ecken höckerartig empor. Die Naht (Sutura) zeigt an, daß diese Schröterart allerdings zum fliegen geschickt seye. Das Schildchen (Scutellum) ist klein, und fast herzförmig, dreieckigt. Sie sind übrigens stark punktiert, unter dem Suchglasse sehr merklich erhaben, gestreift, übrigens aber doch sehr gleißend. Ihre eigentliche Figur giebt die angeführte Zeichnung zu erkennen.

Die Schenkel (Femora) Fig. 4. 8. sind an allen sechs Füßen ziemlich rothbraun und orangefärbig. An ihrer Basis, oder ihrer Insertion haben sie einen schwärzlichen, und an ihrer Spitze oder Insertion der Schienbeine (Tibiae) einen eben so dunkelfärbigen Flecken.



Die Vorderschienbeine (tibiae anticae) sind dreizählig auch vierzählig, wenn man ein fast kaum merkbare zahnartiges Höckerchen mit dazu zählen wollte, von der Farbe der Flügeldecken, und mit einer besondern hakenförmigen Dornspitze bewehrt. Die mittlern und hintern Schienbeine (mediae et posticae) sind ungleich stärker und häufiger stacheliggezähnt. Die Fußblätter (Tarsi) bestehen aus vier Gelenken, die mit röthlichen Dornspitzen, rings um ihre Gelenkfügungen bewafnet sind, und endigen sich mit ein paar Häkchen, zwischen welchen sich noch ein besonderer zarter Stachel befindet. Die Flügeldecken sind so wie die Kinnladen, nur ihre Endspitze, die schwärzlich ist, ausgenommen, sehr angenehm castanienbraun: ihre sehr beträchtliche Glätte theilt ihnen einen eben so beträchtlichen Glanz mit. Der Kopfschild und das Bruststück sind bey weitem dunkelfärbiger. Der Unterleib ist stark mit grauen Härchen besetzt, ausser diesen aber glatt. Die Bauchringe haben die rothbraune Farbe des ganzen Käfers, und sind an ihrem untern Rande meist dunkelfärbiger, oder auch schwärzlich. In manchen Exemplaren lassen sich die Härchen am Unterleibe jedoch nicht immer in gleicher Stärke und Farbe bemerken. Oft sind sie ganz abgeschabt, oft auch statt graulich, fuchseroth.

Das Weibchen hat viel ähnliches, sowohl in Hinsicht ihres Baues, als Größe und Farbe mit dem Männchen. Die Beschaffenheit des Mundes und der Fresswerkzeuge scheint sich nicht sehr von der bereits gedachten, des Männchens, zu entfernen. Da dasselbe jedoch kürzere Kinnladen hat, auch diese sich eben deswegen stärker an einander schliessen können, so sind, wenigstens diese Organe, nicht selten bey weiten weniger in die Augen fallend, als bey dem Männchen. Die Kinnladen fig. 5. 6. 7. sind indeß gerade diejenigen Theile, die am meisten hier Geschlechtsunterschied, wie bey den übrigen Schrütern auch insgemein der Fall ist, gewähren. Diese sind hier zwar gekrümmt, jedoch ungleich kürzer, aber verhältnißmäßig stärker und gewaltiger: ausserdem genau dreiseitig, auswärts und einwärts etwas ausgehöhlt, oder mit einer Furche durchdrungen, die auf beyden Seiten ein Zähnen auslaufen läßt. Ihre Farbe ist schwarz, und ihre Fläche nicht so glatt als an den Wangen des Männchens, sondern mittels sehr vieler Höhlpunite uneben und fast rauh. Der Kopfschild ist hier mehr viereckigt, und mit nicht minder vielen Höhlpunkten übersät, die seine Fläche rauh und dunkelfärbig machen: nur auf der Mitte gegen das Bruststück zu, steht ein Fleck, auf welchem einigermaßen Glätte ist. Die Augen sind etwas heller als an dem Männ-



Männchen. Das Bruststück hat zwar auch sieben, jedoch stumpfere Ecken, ist gewölbt, geränder und ungleich weniger punctirt, daher mehr glatter und glänzender. Das Schildchen ist so wie bei dem Männchen: auch der obere, sowohl als untere Rand des Bruststückes ist mit goldfarbigen Härchen besetzt. Die Flügeldecken haben Form, Farbe und Glätte mit denen des Männchens gemein. Die vordern Schienbeine fig. 8. sind vierzählig, noch einmal so breit und so stark als an dem Männchen: die mittlern und hintern haben auch mehrere und schärfere Zähne; eine besondere krumme Stachelspitze ist daran noch deutlich wahrzunehmen. In Hinsicht der übrigen Eigenheiten ist die Aehnlichkeit des Weibchens mit dem Männchen kaum zu bestreiten, besonders wenn man noch hinzufügt, daß der Unterleib des Weibchens stärker gewölbt als jener des Männchens ist.

Es ist wohl an dem, daß der wahre *Lucanus Capreolus*, eben der, den der seel. Herr Archiater von Linne' unter dieser Benennung und wahrscheinlich zuerst bekannt gemacht hat, von den entomologischen Schriftstellern, die nach ihm dieser Schröterart gedacht haben, oft verkannt und eben so oft mit andern verwechselt worden ist. Die Veranlassung gab, wie leicht zu vermuthen ist, der seel. Mann vielleicht selbst. Das Citat aus dem Merianischen Werk b), und die unbedingte Behauptung c), daß sein *Lucanus Capreolus* mit unsern europäischen Hirschschrüter ungemein viele Aehnlichkeit habe, nur noch einmal so klein, und mit Kinnladen versehen seye, welchen der Seitenzahn fehle, haben wohl das meiste mit zu dieser Verkennung und Verwechslung beitragen können. Es kann seyn, daß man erst später hin, und vielleicht erst, nachdem Degeer den wahren *L. Capreolus* durch seine genaue Zeichnung bekannter gemacht hatte, von den Gedanken abstrahirte, dieser Schröter müsse jener Merianischen Figur gleich sehn, oder welches vielleicht das nemliche sagt, wirklich *Simillimus Lucano Cervo L.* seyn. Denn daß man sich sicher entweder allzuängstlich an diese Merianische Figur hielte, zumal sie auch im *Mus. Lud. Vlr. d)* wiederholt angeführt wurde, oder in Ermanglung derselben, sich aus dem eben angeführten Linneischen Zusatz ein Bild schuf, das doch am Ende nichts mehr und weniger

b) *Histoire des Insectes d'l'Europe dessinée d'après nature et expliquée par Mr. Sib. Merian: traduite du Hollandois en Franc. par Jean Marret.*

Amst. 1730. fol. imp. tab. CLXVIII.

c) *Syst. Nat. ed. XII. p. 560. Quoad figuram.*

d) l. c.



weniger als ein dem Hirschschrüter genau ähnliches Thier darstellen sollte und mußte, dieß ist kaum zu bestreiten. Schon aus einem mässigen Vergleich des wahren Nestschrüters, mit dem von der Frau Merianin vorgestellten, wird sich das unzulässige dieser Zusammenstellung ergeben: man wird es mir aber erlassen, hier umständlich in das Detail dieser in die Augen fallenden Verschiedenheiten zu gehen — um so mehr, da jeder, der Gelegenheit hat, diese Merianische Figur mit der Degeerischen und nun auch mit der meinigen zu vergleichen, hievon sich selbst zu überzeugen Stoff und Anlaß genug finden wird. Dagegen habe ich um jedermann in den Stand zu setzen diese Vergleichung anzustellen, besonders derjenigen halben, die nicht Gelegenheit haben, dieses Werk zu diesem Behufe nachzusehen, die gedachte Merianische Figur genau copiren, und sie als Vignette auf der ersten Seite dieses Bogens vorstellen lassen. Daß sie ohne allen Zweifel eine europäische Schrüterart, und wahrscheinlich nach der Absicht der Frau Merianin selbst vorstellen solle, und wie mir wenigstens dünkt, nichts mehr und weniger als unsern gemeinen Hirschschrüter, nur wegen des Raums der Platte verkleinert, dieß habe ich wohl schwerlich weiterhin zu beweisen Ursache. Doch kann ich nicht umhin noch anzuführen, daß eben diese Figur Anlaß war, in der Folge noch andere ihr ähnliche Vorstellungen, für Vorstellungen des Nestschrüters zu halten.

So wurde eine Jonstonsche Figur e) vom Herrn Hofdiakon. Göze f) mit hieher gezogen, derer man es doch bey all ihrer Unregelmässigkeit ansieht, daß sie wohl schwerlich irgend welches anderes Insekt als den gemeinen Hirschschrüter vorstellen könne.

Gulzers g) Luc. Capreol., den er doch selbst zweifelhaft anzeigte, wurde nicht nur stets hin, sondern auch in einer der neuesten entomologischen Schriften für den Linnschen Schrüter dieses Namens angegeben: ohngeachtet Tüeschly h)

billig

e) Theatr. insect. tab. XIV. tab. 22.

f) Beytr. I Th. p. 121.

g) Abgef. Gesch. d. Insf. Tab. II. fig. 1.

h) Magaz. 2. St. p. 169.



billigen Anstand nahm ihn dafür zu halten, und bald darauf Hr. Past. von Scheven <sup>1)</sup> erklärte, daß er nicht Linné's *L. capreolus* seyn könne. Daß letztere es sonst genau nehmende Entomolog in dieser Sulzerschen Figur einen neuen Schröter erkannte, und ihn den eben so neuen Namen *Hircus* gab — daß er in ihr nicht eher das, was sie wüßlich vorstellt, nemlich nur eine etwas ungewöhnlich vorkommende Abänderung des männlichen Hirschschröters sah: — dieß gehört um näher erörtert zu werden nicht hieher, und ich muß es dem Herrn v. Scheven ferner zu behaupten überlassen. Man sieht aber hieraus, daß die Idee, die man sich von dem Rehschröter anfangs machte, und die man von jener Merianischen Figur copirte, sich tief einprägte, um darnach in andern dieser ähnlichen Vorstellungen sie wieder zu finden <sup>k)</sup>.

Die Degeersche <sup>l)</sup> Vorstellung gewährt ungleich mehr Gewißheit, und sie ist meines Wissens die erste, welche den Linné'schen Rehschröter genau darstellt. Die hinzugefügte Beschreibung ist hinreichend, um ihn auch ohne jene zu erkennen. Von der 1ten Figur der 1yten Tafel ist es unbezweifelt, daß das Männchen damit angedeutet werde, von der 12ten scheint jedoch Degeer selbst ungewiß zu seyn, ob sie das Weibchen vorstellen könne; mir ist es indessen sehr wahrscheinlich.

Olivier's Abbildung des Rehschröters ist mir bisher so wenig als dessen schätzbares Werk zu Gesicht gekommen, weswegen ich auch hierüber nichts weiter sagen kann.

Abänderungen mag diese Schröterart gar wohl fähig seyn, dieß bezeugt nicht nur Degeer, sondern bewährt sich auch durch die verschiedenen Exemplare, die ich hiervon vor mir habe. Sie schränken sich aber meistentheils nur auf die Verschiedenheit der Größe, seltener der Farbe ein. So besitze ich ein Weibchen, das gerade noch einmal so klein als dasjenige ist, von dem ich oben das Maas angegeben habe. Im übrigen, besonders in den wesentlichen Eigenschaften  
kommt

<sup>1)</sup> N. Magaz. 1 B. S. 60.

<sup>k)</sup> Fabric. Ent. Syst. 1. c. und Gmelins Ausgabe des Linn. Naturhist. a. a. O.

<sup>l)</sup> a. a. O.



kommt es mit den übrigen genau überein. So weit aber ist wohl schwerlich der Rehschröter auszuarten fähig, um jener Käferart auch nur von ferne nahe zu kommen, dessen Herr Scriba *m*) unter *Lucanus platyceros* ebenin gedacht hat. Eine Käferart wie diese, besonders europäischer Abkunft kann dann um so weniger hier mit eingeschaltet werden. Eben so wenig gehört der fünfte Geoffroy'sche *Platycerus* hieher, den man sonst, zwar nicht für eine bloße Abart, sondern sogar für den eigentlichen *L. Capreolus* selbst zu halten geneigt war.

Diejenige Varietät, welche Herr Archiater von Linne' im *Mus. Lud. Vr.* (p. 32.) anführt, bezeugt wohl nichts anders als das andere Geschlecht, oder das Weibchen, wie er selbst an angeführter Stelle zu muthmassen scheint. Aber von dem gemeinen Hirschschröter weicht jedennoch unser Rehschröter durch mehrere und wichtigere Merkmale ab, als der Herr Archiater zu glauben sich berechtigt hielt.

Das wahre Vaterland scheint bis izo noch vielleicht mehr als eine Provinz des nördlichen Amerika zu seyn. Degeer bezeugt seine Exemplare aus Pensylvanien erhalten zu haben: die meinigen, die ich besitze, stammen aus Philadelphia ab.

Auf der ersten Kupfertafel bezeichnen die daselbst angebrachten Figuren folgende Gegenstände:

- Fig. 1. Der Rehschröter, das Männchen in natürlicher Grösse.  
 2. Dessen Bruststück, Kopfschild, Kinnlade ic. — vergrößert.  
 3. Die nemlichen Theile seitwärts vorgestellt.  
 4. Ein stark vergrößerter Vorderfuß.  
 5. Bruststück, Kopfschild, Kinnlade ic. des Weibchens in natürlicher Grösse.

Ich habe deswegen das Weibchen hier völlig vorzustellen unterlassen, weil die weggelassenen Theile, wie Flügeldecken, Füße, genau mit denen des Männchens übereinkommen.

6. Eben diese Theile stark vergrößert.  
 7. Wie diese von dem Männchen bey fig. 3., so diese von dem Weibchen hier seitwärts vorgestellt.  
 8. Ein vergrößerter Vorderfuß des Weibchens.

LV.

m) Schrift. der Berl. Gesellsch. Naturf. Fr. 7 B.



## LVCANVS INTERRUPTVS.

## Der Zuckerschroter. Das Doppelschild.

Tab. II. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. Mas. Fig. 6. 7. 8. Femina.

LVCANVS *interruptus*, exscutellatus: antennis arcuatis, corpore oblongo depresso, vertice spina recumbente, thorace abdomineque remotis. LINN. Syst. Nat. ed. XII. n. 4. p. 560. ed. XIII. n. 4 p. 1590.

SCARABAEVS *interruptus*, maxillofus: antennis arcuatis, corpore oblongo depresso, vertice subcornuto, thorace abdomineque remotis. LINN. Mus. Lud. Vlr. n. 31. p. 33.

SCARABAEVS *muticus* oblongus niger depressus, ore forcipato, antennis incurvis. LINN. Mus. Adolph. Fried. p. 82.

GÖEZE Beitr. I Th. n. 4. p. 121.

LVCANVS *interruptus*. FABRIC. Syst. Ent. n. 7. p. 3. Spec. Inf. T. I. n. 7. p. 3. Mantiss. Insect. T. I. n. 8. p. 2.

PASSALVS *interruptus*: niger vertice spina recumbente. FABRIC. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 1. p. 204.

LVCANVS oblongus niger depressus, antennis arcuatis: capite tridentato; elytris fulcatis; thorace abdomineque remotis. DEGEER Inf. T. IV. p. 196. tab. 19. fig. 13. Deutsche Ausgabe.

LVCANVS *interruptus*. Sulzer abgek. Gesch. d. Inf. p. 20. tab. 2. fig. 2.

CVPES *faccharobarba*. VOET Coleopt. T. II. n. 1. p. 31. tab. 29. fig. 1. 2. Deutsche Ausgabe.

LVCANVS *interruptus*. Femina. HERBST Naturgesch. Tab. XXXIV. fig. 4.


MERIAN Insect. Surinam. tab. 50. fig. sup eum larva.

Mensurae.	Longitudo a capite ad anum	Maris.	Feminae.
		lin. $16\frac{3}{4}$	lin. $24\frac{1}{2}$
	mandibulae	3	$4\frac{1}{2}$
	capitis	4	$5\frac{1}{2}$
	thoracis	9	13
	elytri	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$
Latitudo	elytrorum	3	5
	capitis	$5\frac{1}{2}$	8
	thoracis	6	9





*Descriptio Maris.* Palpi inaequales: numeravi *sex*: anteriores quadriarticulati, articulis aequalibus, ultimo ovato, secundo brevissimo: posteriores triarticulati, articulo ultimo incurvo acuto: intermedii biarticulati, articulo ultimo uncinato: omnibus fetis aureis hispidis. Labium arcuatum acutum fetosum. Mandibulae (Fig. 5.) corneae, forcipatae, nudaе, laciniatae: laciniis, altera terminali tripartita, alterali marginali, quarum una alterave obtusior. Clypeus caput tegens transversus, angulis anticis prominulis acutis: uncus (Fig. 1.2.) recurvus validus discum clypei exacte occupat, apice recto prone declinato. Antennae arcuatae undecim articulatae: articulis tribus ultimis lamellatis, reliquis rotundatis; secundo maximo: omnibus fetis aureis hispidis. Oculi globosi vix prominuli. Thorax marginatus (Fig. 3. 4.) planus laevigatus nitidus impunctatus, medio linea longitudinali, punctisque duobus margine impressis. Coleoptera haud adeo arcte cum thorace iunguntur, ut in aliis coleopteris par est, sed distant pectore protenso nudo. Scutellum deest. Elytra plana fornicata laevia nitida striata: striis in singulo decem, quarum tres margini proximae punctis s. crenis distinguuntur. Pectus subvillosum. Sternum acutum elevatum. Abdomen glabrum nitidum. Femora antica ferme tetragona, laevia nitida, margine antico pilis ferrugineis ciliata: media et postica subclavata minus ciliata. Femora postica a mediis ope laminae depressae laevigatae remota distant. Tibiae anticae 3-4 dentatae, tuberculisque aliquot inferne munitae: mediae supra dense hirsutae: posticae inermes nudaе: omnibus vero spina notabilis utrinque terminalis. Tarsi articulis quinque rufo-ciliatis.



De *mare Luc. interr. L.* varietates colore tum intensius, tum laetius ferrugineo possidemus, quas vero, quoniam in omnibus reliquis partibus cum specie nigra depicta convenire viderimus, nullatenus pro genuina atque diversa proponere audemus. Id quod nondum de femina constat. *Acaris* infestari marem docuit praesentia acarorum nonnullorum thoraci subtus adhuc firmiter adhaerentium.

*Descriptio Feminae.* In instrumentorum cibariariorum fabricam sollicito more suo iam inquisivit *Illustr. Fabricius a)* hinc, quod addere possemus, non habemus. Verosimile est, *Virum Celeb.* characteres pro condendo suo novo genere PASSALO a femina duntaxat defumisse vel mutuasse, quoniam id, in quo marem a femina discrepantem observavimus, adumbrationi generis sui subnectere superfedit. — Antennae ut in mare. Clypeus (Fig. 6. 7. 8.) inaequalis, neque tamen adeo quadratus ut in mare, utrinque margine denticulis obsoletis elevatus, declivis, medio carinatus crista acuta: deorsum vero laevigatus. Oculi cinerii ope laminae a margine externo clypei profectae custodiuntur. Thorax (Fig. 6. 8.) multum depressior, ac in mare, glaber, nitens, medio linea longitudinali insculpta, et margine utrinque puncto scabro impresso, et aliud, versus angulum anticum, punctum laevigatius utrinque cernitur: omnis vero margo hirsutiae ferruginea coronatur. Coleoptera in hac tali spatio cylindrico remota distant, quali in mare. Elytra (Fig. 6.) dorso supremo depressa, plana, marginibus et apice fornicata, hinc abdomen occultantia, striata: striis eo plus punctatis, quo magis a dorsi planitiae ad marginem fornicatum inclinantur: in singulo elytro decem, quatuor impunctata, sex punctata: tomentum densum aureum subtus marginibus

B 3

adhae-

a) Ent. Syst. I. c. p. 240. 241.



adhaeret, praecipue in vicinitate anguli antici. Femora antica sicut media et postica compressa subclavata, supra ciliata, subtus nuda. Tibiae anticae sex vel septem dentatae, apice spinulosae, marginibus acutis: subtus prope basin seu insertionem articulosam denticulus s. processus spinulosus proprius observatur, quem dum animal artus contrahit, in propriam eo fine fabricatam foveolam, quae insculpta est in apice femoris abscondere potest: mediae supra villositate aurea dense barbatae, quod minus in anticis et posticis obtinet. Tarsi ut in mare. Sternum carinatum acutum. Abdomen glabrum nitidum. Annulorum abdominalium in hac sat elevatorum margo externus rufociliatus. Pedum mediorum par a posticorum lamina propria cordata remotum est. Reliquum, pedes omnes longitudine haud inter se differunt, omnino tantae moli impares.

---

Das Männchen hat sechs Fressspitzen, die vordern haben ein, die mittlern drey, und die hintern nur zwey Gelenke. Sie sind der Länge nach ungleich, der Dicke aber nach, ziemlich gleichförmig, und durchgehends mit goldfarbigen steifen Härchen, oder Borsten besetzt. Die Mundlippe beschreibt in ihrer Dimension genau einen halben buchtig ausgehöhlten Zirkel, dessen Schenkel sich spitzig endigen. Die goldfarbigen Borsten, womit die meisten Theile des Mundes besetzt sind, und die gerade auf diesem Theil sehr dichte gesät sind, machen ihn auch dem unbewaffneten Auge ohnfehlbar kennbar. Die Kinnladen stellen hornartige Zangen vor, deren Stärke im Verhältniß der Größe des Thiers sehr beträchtlich ist: jede einzelne scheint gleichsam in zwei besondere Theile etwas ungleichförmig gespalten zu seyn, dergestalt, daß die obere Hälfte sich in drey ungleiche Zähne, und die untere oder seitwärts daran stehende sich in zween Zähne theilet. Der Kopfschild ist breiter als lang und erhebt sich seitwärts durch zwar kleine, doch nicht sehr unansehnliche ziemlich scharfe Höckerchen. Gerade auf seiner Mitte ist ein sehr starker Haken befestigt, dessen Spitze zwar seiner Natur nach gekrümmt ist, jedoch nicht nach unterwärts, sondern vorwärts sich streckt.

Die

Die Füßhörner sind in einem Bogen gekrümmt und aus elf Gelenken zusammengeſetzt: drey von dieſen und zwar die letzten oberſten ſtellen eben ſo viele einzelne Blätter oder Lamellen vor, die übrigen ſind bloß kugelförmig, das zweite iſt am größten; alle aber an ihren Gelenken mit goldfärbigen ſteifen Härchen beſetzt. Die kreisförmigen Augen ſtehen eben nicht ſehr herfür. Das ungemein flache Bruſtſtück hat allerdings einen aufgeworfenen Rand, iſt glänzend glatt, ohne alle Punkte, nur in der Mitte mit einer tiefen Längſtreiſe, und ſeitwärts am Rande, und zwar auf beyden Seiten, mit zweyen tiefen Grübchen verſehen. Die Flügeldecken ſtehen bey weitem hier nicht ſo gedrängt am Leibern an, ſondern vielmehr in einiger Entfernung. Die verlängerte Bruſt ſermirt hier eine Art von Halskrage, der das Bruſtſtück vorwärts geſchoben. Dieſer ſeltene Umſtand findet ſich gerade an der Stelle, wo ſonſt das Schildchen, das nun fehlt, ſeinen Standort gewöhnlich zu haben pflegt. Außerdem ſind die Decken, beſonders auf ihrer Mitte, gepreßt, flach, nur ſeitwärts und an ihren Spitzen wölben ſie ſich rings um den Unterleib: ſie ſind glänzend glatt und geſtreift. Dieſe Streifen liegen aber ziemlich tief, und ähneln einigermaßen Furchen, ſie laufen gleichförmig und gerade neben einander hinab. Hohlpunkte oder kleine Kerben liegen nur in den drey oder vier unterſten am Rande, auf den andern ſechs oder ſieben ließen ſich keine bemerken. Die vordern Schenkel ſind beynahe vierſeitig, glatt, glänzend, und am obern Rande gefranzt. Die mittlern und hintern ſind faſt ganz ohne Haare, weniger eckicht, vielmehr keulenartig zugerundet. Die vordern Schienbeine haben drey bis vier ſehr merkliche Zähne, und außer dieſen noch einige wenige nicht ſo ſehr in die Augen fallende Höckerchen. Die mittlern ſind ſehr ſtark mit einem dicken fuchſrothen Filze bedeckt; die hintern dagegen deſto nackter: an allen aber ſieht noch ein ſehr anſehnlicher Stachel. Die Fußblätter haben an allen fünf Gelenke, die rothbraun gefranzt ſind. Die Bruſt iſt auch mit einigen Härchen, bald mehr und weniger beſetzt. Der Bruſtknochen ragt ſcharf hervor. Der Unterleib iſt glatt, glänzend. Die hintern Schenkel ſtehen in einer beſondern Entfernung von den mittlern; zwiſchen welchen eine beſondere geglättete Platte liegt.

Nur von dem Männchen dieſes Schröters iſt mir eine ſehr ſonderbare Abänderung bekannt, die ſich aber durch nichts als durch die Farbe auszeichnet. Dieſe iſt rothbraun, oder eiſenroſtfärbig, und über den ganzen Körper, ſo wohl auf ſeiner obern als untern Seite, verbreitet. An einem andern Exemplar finde  
ich



ich sie minder dunkel; die Theile des Körpers, und besonders die Flügeldecken sind daran überaus zart und weich, weswegen ich vermuthete, es mögten dieses noch ganz frische Exemplare seyn, die noch nicht genug an der Luft verhärtet, um die dunklere und schwarze Farbe anzunehmen. Von dem Weibchen ist mir dieses nicht bekannt. Eine solche rothbraune Varietät ist wahrscheinlich diese, welche Wet Tab. XXIX. Fig. II. abgebildet.

Daß auch diese Käferart von Milben nicht frey seye, davon konnte ich mich durch verschiedene dem gewöhnlichen *Acaro coleoptrata* L. ähnliche Individuen überzeugen, die an einem meiner Exemplare dieses Männchens an dem Halse saßen.

Herr Prof. Fabricius hat mit ungemeiner Genauigkeit bereits schon die Fresswerkzeuge des Weibchens dieses Schröters untersucht und beschrieben: ich finde mich daher außer Stande gesetzt, etwas hierüber noch anzufügen. Indessen ist es mir doch wahrscheinlich, dieser hellsehende Entomolog mögte bey Errichtung seiner neuen Gattung *Passalus*, als worunter dieser ehemalige Linneésche *Lucanus* nun gebracht worden ist, die Gattungsrechte und eigentlichen generischen Charaktere nur von dem Weibchen entlehnt haben. Verschiedene Umstände lassen mich dieses mutmassen. In den Fresswerkzeugen weichen allerdings die beyden Geschlechter dieser Art ab: ich habe es versucht, das abweichende oben bey der Beschreibung des Männchens anzufügen: fortgesetzte Beobachtungen werden entscheiden, ob ich genau genug beobachtet habe.

Der Kopfschild ist ungleichseitig, und bey weitem nicht so viereckigt als an dem Männchen. Auf beyden Seiten stehen am Rande verschiedene, zwar nicht sehr beträchtliche, doch sehr bemerkliche zahnartige Erhabenheiten, die etwas abschüssig sich herunterneigen: in der Mitte bemerkt man eine deutliche fieselartige Erhabenheit, die sich aber vorwärts zahnartig, spitzig aufwölbt. Gegen das Bruststück zu verliert er sich mit einer geglätteten Fläche. Die Fühlhörner verhalten sich hier, wie an dem Männchen.

Das Bruststück ist hier ungleich flacher, glatt, gleissend, in der Mitte mit einem narbenartigen Punkt versehen. Ausser diesem läßt sich etwas mehr oberwärts ein ähnlicher, wenn schon weniger beträchtlicher und geglätteter Punkt wahr-






wahrnehmen. Rings um den ganzen Rand des Bruststückes läuft ein Kranz von rothbraunen Härchen.

Die Flügeldecken sind gerade auch hier, wie an dem Männchen, mittels, der gestreckten und verlängerten Brust, von dem Bruststücke entfernt. Sie sind, und zwar besonders auf ihrer Mitte äusserst flach, und nur seitwärts und an ihrer Spitze um den Unterleib gewölbt: jede einzelne Decke hat zehn Streifen: vier sind davon ohne alle Punkte, die sechs übrigen, oder gerade diejenigen, die sich auf der Wölbung befinden, sehr merklich punkirt. Ein sehr dichter rothbrauner Filz, begränzt ihre Seitenränder, und ist da am sichtbarsten, wo die Flügeldecken an ihrer Basis eine Ecke bilden.

Die Schenkel, die vordern, mittlern, so wie die hintern sind zusammengebrückt, keulenartig, auf ihrer Oberfläche haaricht, auf ihrer untern aber nackend. Die vordern Schienbeine haben sechs bis sieben Zähne, und ausser diesen an ihrer Spitze noch einige kleine Dornspitzen: ihre Ränder sind scharf. Unterwärts oder gerade an ihrer Gelenkfügung sitzt ein besonderer Zahn, den das Thier, wenn es sich bewegt, in ein genau an dem Schenkel befindliches Grübchen senken kann: die hintern sind auf ihrer Oberfläche sehr dichte rostbraun zottigt, dieses dagegen desto minder, an den vordern und mittlern. Die Fußblätter sind gerade hier so wie an dem Männchen. Der Brustknochen steht in Gestalt eines scharfen aufgeworfenen Randes hervor. Der Unterleib ist glatt und glänzend. Die Bauchringe sind hier erhöht, und an ihrem äussern Rande rothbraun gefranzt. Die mittlern Füße stehen ziemlich weit von den hintern entfernt; eine besondere herzförmige und geglättete Platte liegt zwischen ihnen mitten inne. In Hinsicht der Länge zeigt sich an allen drey Paar Füßen kein merklicher Unterschied, ja sie sind im Verhältnisse der Grösse des Thieres kurz genug.

Diese ehemals von dem seel. Herrn Archiater von Linne', auch nachgehends von dem Herrn Prof. Fabricius unter die eigentlichen Schröder (Lucani) gebrachte Käferart, bestimmt nun gegenwärtig, den von dieser sehr abweichenden Fresswerkzeugen zu Folge eine besondere Gattung, die von ihrem Errichter unter dem Namen *Passalus* bekannt gemacht worden ist. Ich würde, und zwar aus eigener Ueberzeugung, mich gerne nach dieser neuen und verbesserten Charakteristik und

Panzers Beytr. 1. Th. E Nomen,



Nomenclatur bequemt, und sie unter diesen Namen auch auf der Kupfertafel bezeichnet haben, wenn nicht eben diese Kupfertafel auch schon vor mehreren Jahren dergestalt vollendet worden wäre, daß es nicht füglich in meiner Willkühr lag, die darunter gesetzte Schrift verändern zu lassen. Ich mache diesen Umstand deshalb bekannt, um jeder Misdeutung hierüber zuvorzukommen.

Ob das von mir hier vorgestellte und auch von andern dafür gehaltene Männchen dieses Schröters, auch in der That das zu diesem Weibchen gehörige Männchen seye, vermag nur der am richtigsten zu bestimmen, der Gelegenheit gehabt hat in dem Vaterlande dieser Käferart gehörige Erfahrungen hierüber anzustellen. Indessen erlaubt es nicht nur der übereinstimmende Körperbau, sondern auch die Analogie, die in ähnlichen Fällen bestimmierte Erfahrungen suppliren muß, sich diesen Schluß zu erlauben. Einige Entomologen erregten demohngeachtet Zweifel hierüber, und ließen sich von der vermeintlichen Verschiedenheit des Vaterlandes beyder hiezu verleiten. So viel ich weiß, erhält man immer beyde Geschlechtsverschiedenheiten, selbst jene oben gedachte braune Abänderung des Männchens durchgehends aus dem nördlichen Amerika. Aber eine dem Männchen sehr ähnliche Verschiedenheit, — ob sie wesentlich oder zufällig seye, wage ich wenigstens hier nicht zu bestimmen — ist es, die man gewöhnlich aus Surinam und überhaupt aus dem südlichen Amerika zu erhalten pflegt, und diese ist es vielleicht, die zu obigen Zweifel Anlaß gegeben hat. Alleine so ist dieselbe, wenigstens so viel mir wissend ist, niemals für das eigentliche Männchen gehalten worden, und ihr fehlt auch zu viel, um dafür geachtet zu werden. Ich will diese Verschiedenheit nur mit wenigem vorläufig kennbar machen.

Eben so groß als das hier von mir abgebildete Männchen, gleiche Farbe, gleiche Glätte, und gleiche Fläche oder Ebene auf dem Bruststück und den Flügeldecken. Der Kopfschild hat kein vorwärts gestrecktes Horn, sondern gerade die nehmlichen Erhabenheiten wie der Kopfschild des Weibchens, dem derselbe hier vollkommen ähnlich ist. Die Streifen oder Furchen auf den Flügeldecken sind nicht etwa nur zum Theil punktirt, sie sind, welches sehr merkwürdig und für diese Verschiedenheit einen sehr auszeichnenden Umstand mitabgibt, alle, und zwar sehr stark punktirt. Alle übrige an dem Weibchen berührten Eigenschaften treffen hier zusammen, so daß man sie, wenn nicht die der durchgehends punktirten Flügeldeckenstreifen hier einträte, füglich für eine widernatürliche kleine oder sonst verkümmerte Spielart des Weib-



Welchens halten dürfte. Indessen kommt sie doch in diesem Zustande zu oft vor, als daß ich es wagen möchte, vor der Hand hierüber also abzuurtheilen.

Daß es Exemplare geben kann, an welchen die Flügeldecken sich an das Bruststück, wie bey andern Käferarten der Fall ist, genau anschließen, ist nicht nur möglich, sondern es bestätigt sich auch, durch die Exemplare, welche Füesly b) und Voet c) besaßen. Es fragt sich aber, welches der natürliche Zustand dieser Käferart seye, der mit anschliessenden Flügeldecken, oder der mit abstehenden, so wie er in den vorliegenden Abbildungen vorgestellt worden ist.

Es ist möglich, daß Exemplare des Zuckerschroters vorkommen, deren Flügeldecken samt dem Unterleibe an der Brust feste und gedrängt ansetzen. Voet selbst hat a. a. Z. einen von solcher Beschaffenheit abbilden lassen. Meinem Erachten nach scheint mir aber letztere ungleich unnatürlicher, und vielleicht weit eher erkünstelt zu seyn, als jene, in der ich alle Exemplare, die ich theils selbst besitze, theils anderswo zu sehen Gelegenheit gehabt, beobachtet habe. Es kann seyn, daß dergleichen Exemplare, bevor sie in die Cabinete sachverständiger Beurtheiler gekommen, durch die Hände unverständiger Insektenhändler gegangen, die wahrscheinlich einen Bruch an dieser Stelle, durch ein solches widernatürliches Zusammenfügen unkennbar zu machen suchten. Es fehlt nicht an Beispielen; welche das gesagte zur Genüge beweisen. Dagegen kommt es mir weit natürlicher vor anzunehmen, daß schon im lebendigen Zustande der Zuckerschroter seine Brust und sein Bruststück so weit, vielleicht noch etwas weiter vorwärts gestreckt getragen habe. Es finden sich nicht nur die allermeisten Exemplare, die nach Europa in die Cabinete der Entomologen kamen, in diesem Zustande vor, es läßt sich dieser Umstand auch an beiden Geschlechtern bemerken: so gar auch an der braunen, vielleicht nicht sehr ausgebildeten Varietät des Männchens. Auch die Analogie erlaubt es, dieses annehmen zu dürfen, die uns belehrt, daß dieser halstragenähnliche Fortsatz, mehreren, größern und kleinern hartschaaligten Insekten, bald mehr bald minder beträchtlich, eigen ist. Wie müßte endlich jene gewaltsame Todesart beschaffen seyn, wodurch erst diese Ausdehnung, oder dieser

b) Magaz. 1 St. p. 63.

c) Tab. XXIX. Fig. 1.




Halstkragen zur Entstehung gebracht würde? Ich zweifle, ob man es bey Insekten, wenn er nicht schon da ist, auch durch den sonderbarsten Kunstgriff dahinbringen könnte, daß er sich in dieser Stärke zeigte. Und wenn auch, so würde man auch fragen dürfen, wozu? und wer mögte es wohl also veranstalten wollen? Doch ich überlasse gerne denjenigen, die Gelegenheit gehabt haben, diesen Schröter lebendig zu sehen, mich zu widerlegen.

Die natürliche Geschichte, und eigentliche Metamorphose dieses Schröters, so wie dessen wahres Vaterland, scheint nach den darüber eingeholten Berichten, noch sehr zweydeutig zu seyn. Die Frau Merianin hat die Larve, wenn sie sich nicht geirrt hat, abgebildet. Der Aufenthalt derselben soll nach den fast durchgehends übereinstimmenden Zeugnisse, derjenigen Autoren, die ich hierüber nachzusehen Gelegenheit gehabt, in den Zuckerrohren, die in den hiezu absichtlich errichteten Plantagen in Hauffen gesammelt werden, sich befinden. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß Surinam, überhaupt aber das wärmere Amerika diesen Schröter hervorbringen könne, ohngeachtet es auch wahr ist, daß das nördliche Amerika denselben wirklich besitzt, wie ich denn selbst mehrere Exemplare aus diesen Gegenden, und besonders jüngst aus Pensylvanien unmittelbar zu erhalten, das Vergnügen gehabt habe.

Auf der zwoten Kupfertafel bezeichnen die daselbst angebrachten Figuren folgende Gegenstände:

- Fig. 1. Der Zuckerschröter das Männchen in natürlicher Grösse.
2. Dessen Bruststück, Kopfschild, Kinnladen, Fühlhörner vergrößert — von der Seite.
  3. Die nemlichen Theile von oben — vorwärts gerückt.
  4. Das Bruststück und der Kopfschild, um einige sehr sichtbare Fresswerkzeuge kenntlich darzustellen.
  5. Kinnladen des Männchens, von beyden Seiten.
  6. Das Weibchen des Zuckerschröters, vollständig in seiner natürlichen Stellung.
  7. Dasselbe — seitwärts.
  8. Das Bruststück und Kopfschild eben desselben.



## LVCANVS CARABOIDES.

## Der lauffkäferartige Schröter.

Tab. III. Fig. 1. 2.

LVCANVS *caraboides*, scutellatus caerulefcens, maxillis lunatis, thorace marginato. LINN. Syft. Nat. ed. XII. n. 7. p. 561. ed. XIII. n. 7. p. 1591.

SCARABAEVS *caraboides*, maxillofus: maxillis lunatis, thorace marginato. LINN. Faun. Suec. n. 407.

GOEZE Beytr. 1 Th. n. 7. p. 123.

LVCANVS *caraboides*. FABRIC. Ent. Syft. n. 8. p. 3. Spec. Inf. T. I. n. 9. p. 3. Mant. Inf. T. I. n. 12. p. 2. Ent. Syft. T. I. P. II. n. 14. p. 239.

LVCANVS *Caprea*, viridi-caeruleus, nitidus depressus, maxillis magnis exsertis. DEGEER Inf. T. IV. n. 3. p. 194. tab. 12. fig. 11.

PLATYCERVS violaceo-caeruleus, elytris laevibus. GEOFFR. Inf. T. I. n. 4. p. 63.

LVCANVS *caraboides*. DEVILLERS Ent. T. I. n. 3. p. 43. tab. 1. fig. 4.

LVCANVS *caraboides*. SCOP. carn. n. 2. ic. 2.

LVCANVS *caraboides*. LAICHARD Verz. u. Besch. d. tyr. Inf. T. I. p. 3. n. 3.

CARABVS *caerulefcens*. VDDMAN. diff. n. 40. ed. nostrae.

CERVVS *volans caeruleus*. VOET. Coleopt. T. II. p. 38. n. 8. tab. 30. fig. 8.

LVCANVS *caraboides*. IABLONSKY Naturgesch. d. K. T. III. p. 310. n. 10. tab. 34. fig. 6. 7.

SCHAEFFER Ic. Inf. Ratifb. tab. 6. fig. 8. tab. 75. fig. 7. var.

HARRER Besch. d. Schaeff. Inf. 1 B. n. 3. p. 6.

Mensurae.	Longitudo a capite ad anum	Mavis.	
	capitis f. clypei	5	$\frac{3}{4}$
	thoracis	1	$\frac{1}{4}$
	elytrorum	3	
Latitudo	capitis f. clypei	1	
	thoracis	1	$\frac{3}{4}$
	elytrorum	2	



*Descriptio Maris.* Palpi quatuor inaequales: anteriores quadriarticulati, articulo ultimo clavato: posteriores triarticulati, ultimo maximo. Maxilla acuta fetosa. Mandibulae corneae forcipatae, margine interiori denticulis 5-6 inaequalibus, basi duobus, punctisque plurimis impressae. Clypeus emarginatus depressus, laevis, punctatus, antice excavatus. Oculi laterales grisei. Antennae undecim articulatae: articulo secundo longissimo, curvato, clavato, 3-7 orbiculatis, 8-11 lamelliformibus: extimo maximo ovato, medio puncto impresso obsoleto. Thorax transversus depressus marginatus laevis, punctatus, marginibus elevatis rotundatis. Scutellum triangulare, obtusius quum in icone. Elytra marginata depressa, postice gibba, striis indistinctis punctatis. Femora subcompressa: anticis macula baseos livida. Tibiae anticae sex vel septem denticulis inaequalibus, pilisque raris obsitae: mediae sicut posticae muticae. Tarsi quinque articulis. Corpus subtus una cum femoribus tibisque nigrum, folis tarsis fuscis. Anus rariter pilosus.

• Color thoracis elytorumque variat, plerumque atro-caeruleus est, quandoquidem in viridem transit.

---

Das Männchen hat vier sehr leicht wahrzunehmende Fressspitzen, wovon die vordern aus vier, und die hintern aus dreyn Gelenken bestehen. Die vier Gelenke der vordern sind zugleich nicht stets sichtbar, weil das erste Gelenk, welches unstreitig am kleinsten ist, von der obern Mundöffnung bedeckt wird; desto weniger Schwierigkeit aber hat es, die übrigen dreyn zu entdecken. Am stärksten und größten scheinen das zweite und vierte oder letzte zu seyn. Die hintern nur aus dreyn Gelenken bestehenden, lassen sich sogleich wahrnehmen: ihr letztes

Ge

Gelenk ist das größte. Die Kinnladen sind auch an dieser Schröterart wie Zangen gebildet, die hornartig, verhältnismässig sehr stark, und an ihrem innern Rande oberwärts mit mehreren, etwa mit fünf bis sechs ungleichförmigen Zähnen, und unterwärts mit noch zweien besondern versehen sind. Die Zahl dieser kleinen Zähne ist nicht immer beständig. Viele tief eingedruckte Punkte lassen sich auf denselben deutlich bemerken. Die obere Mundöffnung ist gespitzt, und steht in Gestalt besonderer Einsel herab. Der Kopfschild ist gerändert, nicht sehr gewölbt, mehr flach, glatt, punktiert, und vorwärts mit einer ziemlich beträchtlichen Ausbuchtung versehen. Die Augen stehen genau seitwärts, und scheinen an dem toden Insekte graulicht zu seyn. Die Fühlhörner bestehen aus elf Gelenken: das zweyte Gelenk ist am längsten, stärksten und gekrümmt: die übrigen bis an das achte sind rundlicht, und aneinander dicht geschlossen, die letzten vier sind blätter- oder lamellenartig. Diese vier letzten bilden vereint die blätterartige Keule. Im lebendigen Zustande kann das Insekt diese vier Lamellen zusammenschließen, und nach Willkühr wieder öffnen. Die letzte Lamelle ist am beträchtlichsten, breit, eckrund: gerade in ihrer Mitte sehe ich unter dem Vergrößerungsglase einen eingedruckten sehr kleinen Punkt, und diesen auch auf der untern Seite, bald mehr, bald weniger ansehnlich. Das Bruststück ist breiter als lang, flach, punktiert: die sehr deutlichen Ränder sind rund und aufgeworffen. Ich bemerkte keine Kerbe daran. Das Schildchen ist dreieckigt, doch nicht so spitzig, wie an der hier vorgestellten Vergrößerung. Die Flügeldecken sind gerändert, eben so flach wie das Bruststück, nur seitwärts gegen die Spitze zu etwas bucklicht. Die Punkte liegen in nicht sehr deutlichen Reihen. Die Schenkel sind durchgehends ziemlich zusammengedrückt: an der Basis der vordern liegt ein kleiner missfärbiger Flecken, der sein Daseyn kurzen dichte an einander gelagerten Härchen zu danken hat. Die vordern Schienbeine sind sechs bis siebenmal ungleich gezähnt, und mit einigen wenigen Härchen besetzt. Die mittlern aber so wie die hintern haben keine Zähne. Die Fußblätter bestehen aus fünf Gelenken. Der ganze Körper ist auf seiner Unterfläche durchgehends schwarz, gerade wie die Füße, nur deren Fußblätter, die braunlicht sind, ausgenommen. An dem After stehen nur einige Härchen.

Die





Die Farbe des Bruststückes und der Flügeldecken ist gewöhnlich dunkel, oder stahlblau. Man kennt aber auch Abänderungen mit grünen Flügeldecken.

Doch auch in Hinsicht der Grösse ändert der lauffäserartige Schröter ab, wie die Ausmessungen des Degeers, Scopoli und Uddmanns mit den messigen verglichen, darthun. Wahrscheinlich zeigten aber die grössern Exemplare nur den Geschlechtsunterschied, das Weibchen vielmehr an. Die Weibchen, die mir von dieser Art vorgekommen, waren allerdings bald mehr und weniger grösser und breiter.

Was Scopoli, Harrer u. a. von der Brust, daß sie ziegelroth von Farbe seye, bemerken, gilt wohl dem allergrössten Theile nach von dem Weibchen. Ich habe noch nie ein Männchen von dieser Beschaffenheit gesehen.

Die abgestorbenen Stämme der Fore, der Eiche werden fast durchgehends für den gewöhnlichen Aufenthalt dieses Schröters angegeben. Auf einem der letzten traf ich ihn selbst einmal an.

Das Vaterland desselben ist ausser unserm deutschen Vaterlande, in dem er bald mehr bald weniger häufig erscheint, auch ein ansehnlicher Theil des südlichen Europa; jedoch nicht mit Ausschluß des nördlichen, in welchem er auch allerdings einheimisch ist. Ob er auch ausserhalb unsers Welttheiles angetroffen worden, kann ich nur vermuthen, aber nicht mit Gewißheit behaupten.

Auf der dritten Kupfertafel habe ich das Männchen dieses Schröters abgebildet lassen, und zwar unten

Fig. 1. dessen natürliche Grösse, und oben  
2. mit ansehnlicher Vergrößerung.

**LVCANVS TARANDVS.**  
**Der Kenntniss Schröter.**

Tab. III. Fig. 3. 4. 5.

LVCANVS *Tarandus*: mandibulis porrectis dentatis, ater nitidus, thorace marginato, elytris punctato striatis.

LVCANVS *tenebroides*: mandibulis lunatis unidentatis ater, thorace marginato, elytris substriatis. FABRIC. Mant. Inf. T. I. n. 11. p. 12. Entom. System. T. II. n. 13. p. 239. T. VI. p. 472. System. Eleutherat. T. II. n. 21. p. 252.

LVCANVS *tenebroides*. HERBST Nat. G. der Käf. T. III. n. 15. p. 314.

LVCANVS *chrysomelinus*. HOHENWARTH in d. Schrift. d. Berl. Gesch. nat. Fr. T. VI. p. 356. tab. 8. fig. 11. MAS.

LVCANVS *tenebroides*. PAYKVLL Faun. Suec. T. III. n. 3. p. 48.

LVCANVS *piceus*. BONSDORF in Act. holm. 1785. T. V. p. 222. tab. 8. fig. a.

LVCANVS *Tarandus*. SCHRANK Faun. boic. T. I. P. II. p. 378.

LVCANVS *Tarandus*. PANZER im Naturf. XXIV. n. 1. p. 2. tab. I. fig. I. Fem.

LVCANVS *Tarandus*. ——— Entom. germ. I. n. 3. p. 245.

LVCANVS *Tarandus*. ——— Faun. insect. germ. LXII. 1. 2. Mas. et Fem.

Mensurae.	Longitudo a capite ad anum Lin.	Mas.	Fem.
		$6\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2} : 6$
	mandibulae	2	$\frac{1}{2} : 1$
	capitis	$1\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3} : 1$
	elytri	4	$3\frac{1}{2} : 3\frac{2}{3} : 4$
Latitudo	capitis	$2\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2} : 2$
	thoracis	$2\frac{1}{2}$	2 : $1\frac{3}{4}$
	elytrorum	3	$2\frac{1}{2} : 2\frac{1}{3}$

*Descriptio Maris.* Palpi quatuor exserti rufo-picei: anteriores quadriarticulati: articulo primo brevissimo, secundo longissimo curvato, reliquis brevioribus, posteriores triarticulati, articulo secundo longiori, tertio breviori apiceque poro pertuso. Mandibulae capite longiores,



giore, porrectae, atrae nitidae, punctis plurimis impressae, apice sublunatae, introrsum flavo-ciliatae, medio unidentatae, basi obtuse bidentatae. Maxilla brevis flavo penicellata. Caput transversum subconvexum atrum nitidum, vertice punctis impressis discretis margine laterali confluentibus: antice excavato-depressum, utrinque immarginatum. Antennae piceae, articulo primo longissimo, reliquis rotundatis, ultimis tribus lamellatis. Oculi subglobosi fusci. Thorax transversus depressiusculus, subquadratus utrinque marginatus: margine laterali utrinque subsinuato repando: dorso punctis plurimis impressis, foveolaque utrinque antice relicta. Elytra nigra, seu potius obscure fusca nitida, marginata, abdomine longiora, dorso depressiuscula, apice convexiora: striis decem subelevatis punctatis, et totidem seriebus punctorum impressorum: striis tamen aliquot ad marginem lateralem sitis et ad apicem usque decurrentibus obsoletioribus. Scutellum subtriangulare obtusum nitidum, antice punctatum postice laeve. Pedes omnes picei nitidi, femoribus omnibus clavato-compressis: tibiis anticis extus 6-7 argute dentatis: mediis et posticis minus dentatis hinc vel illinc rufo ciliatis. Tarsi quinque articulati, subtus aequo rufo ciliati.

*Descriptio Feminae.* Mandibulae breviores, multo vero crassiores atque validiores: dentium harum divisio et ortus ac in mare. Antennae maris simillimae. Caput, nisi brevius et angustius, ac in mare. Eadem thoracis conditio, foveolis dorsalibus binis aequae visibilibus, pariterque prominentia dorsali per medium dorsi transversim ducta. Elytra ut in mare, striis hinc vel illinc obtusioribus et obsoletioribus. Pedes ac in mare, tibiis anticis argutius et crebrius dentatis.

Corpus totum, quod figuram parallelipipedi exacte aemulatur, eandem formam, circumscriptionem, sculpturam et colorem cum mare suo servat, duplo vero minus magisque opacum est.

Habitat in ligno putrido Pini, Abietis, Carpini. *In Rossia* Dn. BOEBER. *In Westrogothiae* lapidosis menſe Iunii Dn. BIERKANDER. *In Saxonia* prope Tharand Dresdae Dn. ZENKER. *In Bavaria* Dn. SCHRANK. *In Carintbiae* montosis Dn. de HOHENWARTH.

Das Männchen hat vier Greſſſpißen, die ziemlich hervorstehen und von rothbrauner Farbe sind. Die vordern sind viergliederig, an welchen das erste Glied am kürzesten, das zweite am längsten und gekrümmt ist, die übrigen aber um vieles kürzer sind. Die hintern Greſſſpißen haben nur drey Glieder, von welchen das zweite ziemlich lang, das dritte aber ungleich kürzer und an seiner Endspitze mit einer, nur unter einem guten Suchglase zu entdeckenden kleinen Oeffnung (d) versehen ist. Die Kinnladen sind länger als der Kopf, fast gerade vorwärts gestreckt, schwarz, glänzend, mit vielen Hohlpunkten, und nur an der äußern Spitze, vom Anfange des mittlern Zahns, hakenförmig gekrümmt, oder halbmondförmig gebogen. An ihrer innern Seite sind sie rothgelb gefranzt, in der Mitte mit einem einzigen stizigen Zahn, und an ihrer Basis aber mit zwey Zähnen, nur ungleich stumpfern, bewafnet. Die dieser Gattung eigenen pinselartigen Fortsätze (e) der Unterlippe, oder wie sie Fabricius noch zu nennen pflegt, die Kinnbacke — zeigen sich auch an dieser Art, in ihrer gewöhnlichen Form, nur sind sie verhältnißmäßig kurz. Der Kopf ist breiter als lang, ziemlich gewölbt, schwarz, glänzend, in der Mitte des Scheitels mit einzeln stehenden Hohlpunkten, die jedoch seitwärts zusammenfließen, versehen. Vorwärts hat derselbe noch eine eingedruckte sehr merkliche Vertiefung, doch ringsherum keinen bemerkbaren Seitenrand. Die

D 2

Fühl.

(d) Knoch's neue Beytr. I. p. 30.

(e) Illiger Käf. Preuß. Vorede S. 36.



Hörlhörner sind pechbraun, ihr erstes Gelenk ist länger als alle übrigen, welche rundlicht sind: nur die drey letzten haben die dieser Gattung eigene lamellenform. Die braunen Augen sind fast regelmäßig kugelförmig. Das Bruststück ist, gleich dem Kopfe breiter als lange, ziemlich flach, fast viereckicht, und seitwärts deutlich mit einem hervorstehenden Rande, welcher ziemlich buchtig ausgeschweift ist, umgeben. Auf dem Rücken sind sehr viele Hörlpunkte, und vorwärts zu beyden Seiten ein sehr sichtbares Grübchen. Die Flügeldecken sind schwarz, oder vielmehr sehr tiefbraun, glänzend, gerandet, länger als der Unterleib, auf dem Rücken etwas flach, doch gegen ihre Spitze zu gewölbt. Auf jeder einzelnen Decke liegen zehn (f) etwas erhabene punktirte Streifen, deren Zwischenräume gleichfalls punktiert sind. Nicht alle Streifen sind gleich sichtbar oder von gleicher Stärke; einige, zumal die sich dem Seitenrande nähern, werden da fast ganz unscheinbar. Das Schildchen ist dreyeckicht, glänzend, vorwärts punktiert, gegen die stumpfe Spitze zu aber sehr glatt. Alle Füße sind pechbraun und glänzend. Die Schenkel sind keulenförmig und zusammengedrückt. Die Vordersehenbeine sind auswärts sechs, auch siebenmal stark spizig gezähnt. Die mittlern und hintern nur weniger schwächer und stumpfer, auch hie und da rothbraun gefranzt. Die fünfgliederichten Fußblätter sind unterwärts eben so rothbraun behaart.

An dem Weibchen sind zwar die Kinnlaben ungleich kürzer, jedoch um desto dicker und stärker als an dem Männchen. Die Anzahl der Zähne so wie deren Standort verhält sich doch gerade bey diesem so wie bey jenem. Auch in Hinsicht der Hörlhörner verhält es sich so. Der Kopf ist nur kürzer und schmaler als an dem Männchen. Das nehmliche gilt auch von dem Bruststücke, an dem so wohl die beyden Seitengrübchen, als die über den Rücken laufende Quererhöhung auch sichtbar ist. Die Streifen auf den Flügeldecken sind an diesem nur schwächer und stumpfer. Die Füße hingegen sind wie bey dem Männchen, und deren Schenkeine noch öfter und stärker gezähnt.

Der ganze Körper, der die Figur eines Parallelepipedum fast regelmäßig hat, ist in Hinsicht seines Umrisses, Sculptur und Farbe mit dem des Männchens gleichförmig, nur noch etwmal so klein, und minder glänzend.

Abanz

(f) Bonstorf (N. Schwed. Abhandl. VI. p. 218.) zählt nur neun; Paykull a. a. O. hat sie gar nicht gezählt.

Abänderungen, wiewohl nicht sehr erhebliche hat auch diese Schröterart. Das Männchen varirt in Ansehung seiner Größe, und Länge seiner Kinnladen: auch ist es nicht selten bald mehr, bald weniger schwarz, oder tiefbraun. Auch das Weibchen ändert also ab. Man erkennt es aber leicht, an seinem kürzern und fetttern minder glänzenden Körper, an seinen kürzern und ungleich stärkern Kinnladen, und an der aufgeworfenen Queererhöhung auf dem Bruststück.

Schweden, Rußland, Kärnthen, Deutschland, und daselbst Sachsen und Bayern sind gegenwärtig, so viel ich weiß, die Gegenden, in welchen man diese bisher noch immer sehr seltene Schröterart, in faulen Fichten, Föhren und Weißbuchenholz angetroffen hat.

Auf der dritten Kupfertafel ist das Männchen dieses Schröters vorgestellt, und zwar

- Fig. 3. in natürlicher Größe  
 4. mit sehr starker Vergrößerung  
 5. eben so, im Profile.



## GEOTRVPES SATYRVS.

## Der Satyr.

Tab. IV. Fig. 1. 2. 3. 4.

GEOTRVPES *Satyrus*: thoracae inermi untice truncato, capitis cornu recurvo capite longiori. FABRIC. Entom. system. Supplem. n. 44. p. 18. System. Eleutherat. I. n. 49. p. 15.

SCARABAEVS *Satyrus*. FABRIC. System. Entom. n. 36. p. 12. Spec. Inf. T. I. n. 42. p. 12. Mant. Inf. T. I. n. 44. p. 7. Entom. system. T. I. n. 49. p. 17.

SCARABAEVS *iamaicensis*. DRYVY Inf. exot. I. p. 125. tab. 34. fig. 1. 2. Uebersetz.

SCARABAEVS *Satyrus*. OLIV. Inf. I. 3. 39. 43. tab. II. fig. 49.

SCARABAEVS *Satyrus*. HERBST. Nat. d. Käf. T. II. n. 67. p. 82.

SCARABAEVS *Satyrus*. PANZER Faun. Amer. boreal. prodr. n. 5. p. 2.

<i>Menfurae.</i>	Longitudo	a capite ad anum	Lin	13 $\frac{1}{2}$
		cornu capitis		3 $\frac{1}{2}$
		thoracis		3
		elytri		7
		capitis		2 $\frac{1}{2}$
Latitudo		thoracis		6 $\frac{1}{2}$
		elytrorum		7

*Descriptio Maris.* Capitis clypeus planiusculus, ater nitidus punctatus, pone rotundatus, antice angustatus profundeque emarginatus. Cornu capitis clypeo insidens atrum, nitidum, laeve, simplex, adscendens, apice subulato-recurvum, basi punctatum, longitudine thoracis summmitatem aequans. Oculi subglobosi glauci. Antennae fuscae nudaе, clava trilamellata. Thorax ater elevatus glaber, margine laterali repando ciliato, antice excavato truncatus. Scutellum triangulare obtusum. Coleoptra quadranguliforma, seu aequae lata ac longa; haud arcte tamen cum thorace iunguntur, sed spatio interiecto rufo



rufo setoso distant; id quod etiam an in animali vivo obtineat, ignoro. Elytra atra nitida marginata, margine laterali subsinuato: fornicata apice gibba, abdomen obtegentia neque vero occultantia: striis sex punctatis, quarum quinque margini laterali propius adiacent, spatio in medio dorso relicto irregulariter punctato: sexta immediate futurae proxima. Haec sexta striarum, ad basin deliquium patitur, dein vero recta progreditur. Angulus elytrorum quisquis, lamina subcordata insignis, quae strias tres basi quasi seiungere videtur. Corpus totum subtus hirtum f. ferrugineo setosum, abdominis segmentis postice albicantibus. Anus nudus f. non vaginatus, pariter ferrugineo setosus. Pedes atrii nitidi ferrugineo hirti. Femora valida crassa clavata. Tibiae anticae dilatatae compressae tridentatae, spinaque acuta subincurva terminali: mediae et posticae extus argute aut irregulariter dentatae. omnes autem apice spinosae. Tarsi atrii ciliati, articulis quinque, primo triquetro.

Alterum sexum *Geotr. Satyri* nosse nondum certo evenit: et quamvis Cl. OLIVIER *Geotrup. Arietem* feminam nostri iudicet, ulteriori examini digna haec tamen habenda est observatio; siquidem et patria utriusque speciei diversa id exigere videtur.

Habitat in America boreali. FABRIC. In Noveboraco Americae. *Drury*. Nostrum exemplar in Insul. St. Luciae lectum est.

---

Der Kopfschild, welcher die Mundtheile, die ich wegen der Seltenheit, dieses mir nicht zuständigen Exemplares, nicht untersuchen konnte, bedeckt, ist ziemlich flach, schwarz, glänzend, punktiert, hinterwärts zugerundet, vorwärts aber schmäler laufend, und an seiner Spitze tief ausgeschnitten, so stark, daß man  
den



denselben fast zweispaltig (bifidus) nennen könnte. Das sogenannte Kopfhorn sitzt unmittelbar auf dem Kopfschild, und dieses ist schwarz, glänzend, glatt und eben, einfach, aufgerichtet, an seiner pfeilenförmigen Spitze sanft rückwärts gekrümmt, nur an seiner Basis punktiert, und von gleicher Höhe mit dem Bruststücke. Die ziemlich kuglichten Augen sind staargrau. Die Fühlhörner sind braun und unbehaart: die drey letzten Gelenke vereinigen sich in drey Lamellen. Das Bruststück ist schwarz, hoch, glatt, seitwärts ausgeschweift, gefranzt, und vorwärts ausgehöhlt abgestumpft. Das Schildchen ist dreyeckicht, stumpf. Die beyden Flügeldecken haben zusammengekommen eine viereckigte Form, ihre Dimension weist es aus, daß sie fast eben so breit als lang sind; sie stehen nicht so gedrängt an dem Bruststücke wie bey andern Arten, sondern in einer durch einen rothbraun steifhaarigten Raum abgesonderten Entfernung. Es kann seyn, daß dieses nur der Fall bey dem leblosen Thiere ist: vielleicht auch doch bey dem lebendigen, um das Bruststück bequemer vorwärts zu strecken, nur fehlen hierüber entscheidende Beobachtungen. Die Flügeldecken sind schwarz, glänzend, mit hervorstehenden Seitenrand, welcher sehr merklich geschweift ist: ihre Wölbung ist beträchtlich, doch stärker noch an ihrer Spitze, woselbst sie sogar höhericht werden; sie liegen zwar auf dem Unterleib, doch hüllen sie ihn nicht ein. Sie sind punktiert gestreift, und zwar durch sechs punktierte Streifen. Es ist bey dieser Art besonders merkwürdig, daß von diesen sechs Streifen, fünf dem Seitenrande sehr genähert sind, da gegen die sechste, oder wenn man will, die erste, desto stärker der Naht, wodurch also zwischen dieser Nahtstreife und den fünf übrigen, ein ungestreifter, jedoch irregulär punktirter Zwischenraum statt finden muß: ferner zeichnet sich diese Nahtstreife noch dadurch aus, daß sie an ihrer Basis bognicht enfspringt, bald darauf aber gerade fortschreitet. Ferner ist es merkwürdig, daß jede Flügeldecke Ecke, an ihrer Basis gleichsam fast mit einer herzformigen Lamelle ausgezeichnet, so daß dieselbe daselbst fast drey Streifen zu decken scheint. Der ganze Körper ist auf seiner Unterfläche steifhaarig, oder eisenrothfärbig borstig, ohngeachtet die Bauchsegmente weißlicht sind. Der letzte unbedeckte Bauchring, oder der Afterring ist eben so rothfärbig borstig. Die Füße sind schwarz, glänzend, rothfärbig, steifhaarig. Die Schenkel sind stark, dick, keulenförmig. Die Vordersehnenbeine sind breit erweitert, dreyzähnig, und endigen sich mit einem ziemlich gekrümmten scharfen Stachel. Die mittlern und hintern sind auswärts scharf, jedoch regellos gezähnt, alle jedoch an ihrer Spitze stachlicht. Die Fußblätter

blätter sind schwarz, gefranzt, fünfgliedericht; das erste Gelenk ist das stärkste, größte und drehseitig.

Olivier hält den *Geotrupes Aries* für das Weibchen unsers *Satyrus*: es kann seyn, aber hierüber zu entscheiden, fehlt es mir an Gründen. Wenn das Eicat aus Drury, welches Herr Prof. Fabrizius, nun seinem *Geotrupes jamaicensis* wegnimmt, und gegenwärtig unserm *Satyrus* übergiebt, richtig ist, woron ich nicht zu zweifeln Ursache habe, so wäre dann auch über das andere Geschlecht dieses *Geotrupen*, keine Frage mehr, weil eben daselbst auch das Weibchen steht, das der Analogie nach dahin gehört.

Ueber das Vaterland dieses *Satyrus* scheint man fast einig zu seyn: die meisten die seiner gedenken, nennen das nördliche Amerika als Stammort desselben. Newfark sey die Provinz, woher Drury seine Exemplare erhielt. Dieses Exemplar, nach welchem ich diese vorhandene Zeichnungen verfertigen ließ, erhielt der seel. Herr Hofrath und Prof. Rudolph zu Erlangen aus St. Lucie, nebst mehreren andern, der mir auch erlaubte davon gegenwärtigen Gebrauch zu machen.

Auf der vierten Kupfertafel steht dieser *Satyrus* bey

- Fig. 1. in natürlicher Grösse da Männchen  
 2. mit ansehnlicher Vergrößerung  
 3. eben so im Profile  
 4. ein Theil des Bruststücks mit dem Kopfschild und dem darauf stehenden Kopshorne, sichtbar stark vergrößert.



SCARABAEVS QVADRIDENS.  
Der vierzahnigte Dungkäfer.

Tab. V. Fig. 1. 2. 3. 4.

SCARABAEVS *quadridens*: scutellatus thorace quadridentato, capitis cornu elevato simplici, corpore ferrugineo FABRIC. Spec. Inf. T. I. n. 37. p. 11. Maut. Inf. T. I. n. 39. p. 6. Entom. system. T. I. n. 42. p. 15. System. Eleuth. T. I. n. 6. p. 23.

SCARABAEVS *Vnicornu*: scutellatus testaceus, thorace antice bifexcavato quadrituberculato, capitis cornu truncato. SCHRANK im Naturf. XXIV. n. 2 p. 61.

SCARABAEVS *Vnicornu*. SCHRANK Faun. boic. T. I. P. II. p. 381.

SCARABAEVS *quadridens*. OLIV. Inf. I. 3. 62. 69. tab. 12. fig. 108.

SCARABAEVS *quadridens*. PANZER Entom. germ. I. n. 3. p. 2.

SCARABAEVS *quadridens* — Faun. Inf. Germ. XII. 1. Mas et Fem.

		Mas.	Fem.
<i>Mensurae.</i>	Longitudo		
	a capite ad anum Lin.	6	5
	capitis	$2\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{4}$
	cornu capitis	$\frac{1}{2}$	—
	thoracis	$2\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{3}$
	elytri	4	$3\frac{2}{3}$
Latitudo	capitis	2	$1\frac{2}{3}$
	thoracis	4	$3\frac{3}{4}$
	elytrorum	$4\frac{1}{8}$	4

*Descriptio Maris.* Palpi quatuor inaequales: anteriores quadriarticulati: articulis primo et tertio brevioribus, quarto clavato: posteriores triarticulati breviores, articulo secundo reliquis longiori: omnibus ferrugineis glabris nitidis ad basin et ad iuncturas longisetosis. Mandibula cornea adunca e basi lata triquetra, basi ferruginea, apice acuta nigricans: externa superficies late pilosa, ad basin scrobiculata: interna concava rufo pilosa: margine exteriori acuto corneo edentulo, inter-

interiori membranaceo. Maxilla sublinearis cornea ferruginea, basi articulata, externo margine processu spinoso arcte adhaerente, fetisque longis aucta: interno margine subnudo, apice bis curvato spinoso: apice summo insidet adhuc alius processus, qui subtriangulus, angusta basi affixus, apice utrinque breviter spinosus, utrinque convexus, fetisque plurimis rufis stipatus. Labium membranaceum pallide ferrugineum, apice rotundato bipartitum rufo pilosum. Mentum basi dilatatum apice angustatum, disco gibbum rufum, fetis plurimis rufis tectum. Labrum transversum ferrugineum, antice submarginatum postice integrum, punctis plurimis impressis confluentibus, ad margines angustos laterales rufo pilosum. Antennae ferrugineae; articulo primo maiori, reliquis rotundatis aequalibus, ultimis tribus ovato-lamellatis; articulis prioribus longe rufo-fetosis, reliquis nudis. Oculi globosi atritidi. Capitis clypeus ferrugineus utrinque reflexus, margine laterali subangulato, antice truncatus integer, postice processu lunato oculos antice cingente, supra punctis plurimis confluentibus impressis, corniculo brevi apice nigricante obtuso. Thorax ferrugineus gibbus, punctis plurimis impressis, margine laterali rufo ciliato subrecto, postico subexciso-sinuato, lineolaque longitudinali dorso abbreviata plus vel minus obsoleta, punctoque irregulari nigricante utrinque laterali; antice supra dentibus quatuor elevatis, lateralibus minoribus, et sub dentibus bis profunde sinuato-excavatus. Scutellum triangulare glabrum impunctatum. Elytra convexo gibba ferruginea nitida marginata, abdomine paullo breviora, argute punctato-striata; striis quindecim; ita autem, ut decem tantum striae a basi decurrant, reliquis quinque infra basin ad marginem lateralem oriundis. Sutura margineque laterali nigricantibus. Pedes omnes rufi ferrugineo pilosi: tibiae anticae per totam longitudi-



nem (6-7) obtuse dentatae, apice spina aucta solitaria: mediae et posticae angulatae inaequaliter (3-4) denticulatae, rufo fetosae, apice spina acuta ordinaria. Tarsi concolores quinque articulati. Femora omnia compresso clavata pallidius ferruginea.

*Descriptio Feminae.* Clypeus subangulatus, antice truncatus, occipite linea transversa elevata, puncto medio prominulo. Thorax gibbus glaber punctatus, antice lineola abbreviata elevata transversa. Elytra ut in mare; nec pedes differunt. Corpus magis globosum.

Variat haec species nonnisi, in triginta et ultra quae vidi exemplis, magnitudine, cornu maris saepius abbreviato, coloreque intentius ferrugineo, quandoquidem et laetiori.

Habitat, quod verosimile est, more conspicerum in stercore animalium: in Italia, Gallia, Germania australi. In India orientali FABRICIVS.

---

Das Männchen hat vier ungleichförmige fadenförmige Fressspitzen, deren vordere aus vier Gliedern bestehen. Von diesen ist das erste und dritte Glied am kleinsten oder kürzesten, das vierte ist keulenförmig. Die hintern sind wie gewöhnlich kürzer, und dreigliedericht. Das zweite Glied ist am längsten, alle aber sind glatt, glänzend, eisenrothfärbig, an ihrer Basis so wie an den Gelenkfügungen mit langen hellbraunen Borsten besetzt. Die Kinnladen sind hornartig, dreiseitig, stark und gekrümmt, an ihrer breiten Basis rothbraun, an ihrer Spitze schwärzlich. Auswärts sind sie breit, haarigt, an ihrer Basis eingetieft: inwärts ausgehöhlt rothhaarigt. Der äußere scharfe hornartige Rand ist ungezähnt, der innere membranös. Die Kinnbacke hat fast gleiche Breite, ist hornartig, rothfärbig, an der Basis gegliedert, und an dem äußern Rande mit

mit einem festverwachsenen stachelichten Fortsatze versehen, und überdieß noch mit langen Borsten besetzt. Der innere Rand ist fast kahl, und an der Spitze mit zwey gekrümmten Stacheln bewehrt. Auf der obersten Spitze steht noch ein anderer Fortsatz, von dreyeckichter Figur, der mit seiner schmalen Basis fest sitzt, auf seiner Spitze beider Seiten kurzstachelicht, und an den beyden Seiten convex, und mit sehr vielen rothbraunen Borsten umgeben ist. Die Lippe ist häutig bleichrothfärbig, an der Spitze rundlicht geheilt und rothhärlich. Das Kinn ist an seiner Basis breit, an der Spitze schmal, in der Mitte höher, rothbraun, und mit sehr vielen rothbraunen streifen Haaren bedeckt. Die Lefze ist breiter als lang, eisenrothfärbig, vorwärtig einigermassen ausgeschnitten, hinterwärts aber ungetheilt, mit sehr vielen zusammenfließenden Hohlpunkten übersät, und an den schmalen Seitenrändern rothbraun haaricht. Die Fühlhörner sind rothfärbig: das erste Gelenk ist am größten, die übrigen rundlicht, gleichförmig, die drey letzten formiren eine dreylättrichte eyrunde Kolbe. Die ersten Gelenke sind mit langen steifen Borsten besetzt, die übrigen aber kahl. Die fuglichten Augen sind schwarz und glänzend.

Der Kopfschild ist rothfärbig, an beyden Seiten zurückgebogen, am Seitenrande eckicht, vorwärtig abgestumpft ungespalten, hinterwärts mit einem halbmondsförmigen Fortsatze versehen, welcher sich um die Augen schlingt. Seine Oberfläche ist mit sehr vielen zusammenfließenden Hohlpunkten bedeckt, und außerdem noch mit einem fast in der Mitte stehenden kurzen stumpfen geradestehenden Horne, das an seiner Spitze schwärzlich ist, bewaffnet. Das Bruststück ist rothfärbig, bucklicht, hohlpunktirt, gerandet, am Seitenrande rothbraun gefranzt, und am Hinterrande ausgeschweift. Auf dem Rücken liegt eine hohlgelende öfters fast unscheinbare länglichte Streife, und auf beyden Seiten ein regelloser schwarzer Punkt. Vorwärts stehen auf seiner Höhe vier sehr beträchtliche Zähne, von welchen die beyden untern oder seiwärtestehenden am kleinsten sind. Unter diesen sogenannten Zähnen ist derselbe zweymal sehr tief buchtig ausgehöhlt. Das Schildchen ist dreyeckigt, glatt und punktilos. Die Flügeldecken sind convex, bucklicht, rothfärbig, glänzend, gerandet, etwas kürzer als der Unterleib, scharf punktirt gestreift. Man kann funfzehn solcher Streife zählen, doch so, daß nur zehn von der Basis derselben an beginnen, die übrigen fünf aber unter der Basis hart an dem Seitenrande, gleichsam aus einem gemeinschaftlichen Punkte entspringen. Die Naht, und die Seitenränder sind schwärzlich. Alle





Füße sind rothbraun und haarig: die Vordersehenbeine sind ihre ganze Länge herunter sechs bis siebenmal stumpf gezahnt, und an ihrer Spitze mit einem einzelnen doch starken Stachel besetzt: die Mittlern, und Hintern sind eckicht und ungleich drey bis viermal gezähnt, rothbraunborstig, und an ihrer Spitze mit dem gewöhnlichen Stachel versehen. Die Schenkel sind breit keulensförmig, nur hellrother. Die fünfgliederichten Fußblätter sind gleichfärbig.

Der Kopfschild des Weibchens ist eckicht, vorwärts abgestumpft, hinterwärts daselbst, wo bey dem Männchen das Horn steht, mit einer aufgeworfenen Querstlinie, die in der Mitte ein erhabenes Pünktchen hat, versehen. Das Bruststück ist eben so conver bucklicht wie bey dem Männchen, gerade so glatt, punkirt, nur vorwärts statt der vier Zähne, fast an eben dieser Stelle, mit einer kurzen etwas erhöhten Querstreife gezeichnet. Die Flügeldecken sind fast gerade so wie bey dem Männchen, welches auch von den Füßen gilt. Der ganze Körper des Weibchens ist indeß doch kuglichter und völler.

Abänderungen, die ich an mehr als dreysig Exemplaren, die ich sah, wahrnehmen konnte, sind größtentheils unbeträchtlich, und schrecken sich hauptsächlich, nur auf die verschiedene Größe und mehr oder weniger dunkel und hellere rothfärbige Farbe ein. Am beträchtlichsten ändert indeffen das Hörnchen des Männchen ab, dieses ist oft sehr klein und unansehnlich.

Wahrscheinlich hält sich auch dieser Käfer, nach der Lebensweise seiner Gattungsgenossen, im Dünger und Auswurf größerer Thiere auf, ohngeachtet noch niemand, das ich wüßte, sich hierüber ganz bestimmt erklärt hat. Die ersten Exemplare die ich erhalten, wurden mir aus Neapel und Rom zugeschickt: nachher erfuhr ich, daß er in Desfereich nicht selten seye. Auch in Frankreich ist er zu Hause.

Herr Prof. Fabricius verlegt ihn so gar nach Ostindien, welches ich dahin stelle. Dieser Umstand gab indeffen Veranlassung zu glauben, daß mein Aeneas, und der Quadridens zwey verschiedene Arten seyen. Doch da Herr Prof. Fabricius meine Zeichnung bey seinem Quadridens mit anführt,  
und



und er selbst, die von mir ihm zugeschickten Exemplare für seinen Quadridens erkannt hat, so wird es wohl verzeihlich, wenn ich mich hier auch seiner Nomenclatur bedient habe.

Auf der fünften Kupfertafel ist das Männchen vorgestellt und zwar bey

- Fig. 1. dessen natürliche Grösse  
2. mit ansehnlicher Vergrößerung  
3. Kopf und Bruststück vorwärts  
4. — — — — rückwärts.



ATEVCHVS PILVLARIVS.  
Der Fabriziousſche Pillenkäfer.

Tab. V. Fig. 5. 6. 7. 8.

ATEVCHVS *pilularius*: clypeo submarginato, niger opacus laevis, clypeo lineis duabus elevatis obliquis, antennis nigris. FABRIC. System. eleuth. T. I. n. 27. p. 60.

SCARABAEVS *pilularius*. FABRIC. Entom. system. T. I. n. 222. p. 67.

COPRIS niger, capite clypeato, elytris margine exteriori sinuatis. GEOFFR. Inf. T. I. n. 8. p. 91.

SCARABAEVS *Geoffroyae*. SVLZER abgek. Gesch. d. Inf. p. 18. tab. 1. fig. 7.

SCARABAEVS *Geoffroyae*. ROSSI Faun. etrusc. T. I. n. 35. p. 16. ed. Hellwig. I. n. 35. p. 16.

SCARABAEVS *pilularius*. FREYSLER Inf. bohem. I. n. 38. p. 40.

SCHAEFFER Jc. Inf. Ratisb. tab. 3. fig. 7.

HARRER Beschr. der Schäff. Inf. I. n. 18. p. 23.

SCARABAEVS *aethiops francofurtensis*. VOET Coleopt. T. II. P. 20. n. 28. tab. 26. fig. 28.

COPRIS *Geoffroyae*. SCRIB. Journ. I. n. 35. p. 54.

HERBST Nat. d. Käf. T. II. tab. 20. fig. 5.

ACTINOPHORVS *Geoffroyi*, et *pilularius*. STURM Handb. I. n. 68 et 69. p. 78 et 79. tab. III.

OLIVIER Inf. I. 3. 161. 198. tab. 10 fig. 91.

SCARABAEVS *Geoffroyae*. PANZER Faun. inf. XLIX 10.

SCARABAEVS *Geoffroyae*. — Entom. germ. I. n. 71. p. 18.

<i>Menſurae.</i>	Longitudo	a capite ad anum	Lin.	7	:	$6\frac{1}{2}$	:	6	:	5	:	$4\frac{1}{2}$	:	4.
		capitis		2		:	$1\frac{1}{2}$	:	$1\frac{1}{4}$					
		thoracis		$2\frac{2}{3}$		:	2	:	$1\frac{1}{2}$					
		elytri		4		:	$3\frac{1}{2}$	:	3		:		$2\frac{2}{3}$	

Latitu-



Latitudo	capitis	$2\frac{1}{4} : 2 : 1\frac{3}{4}$
	thoracis	$4\frac{1}{4} : 3\frac{1}{2} : 3$
	coleoptrorum	
	1) basi	$4\frac{3}{4} : 4\frac{1}{2} : 3\frac{1}{2} : 3$
	2) apice	$3\frac{1}{2} : 3 : 2\frac{3}{4} : 2\frac{1}{2}$
Longitudo a capite ad basin elytr.		$4\frac{1}{2} : 3\frac{1}{8} : 2\frac{7}{8}$

Palpi quatuor: anteriores maxillae medio affixi quadriarticulati: articulo primo minutissimo, secundo et tertio triangulis crassiusculis longioribus, quarto longissimo lineari subclavato: omnibus glaberrimis fuscis afetosus. Maxilla cornea inaequalilateris fusca, setosa, apice obtusa: altero latere membranaceo alata, lobo spongioso villosa obtuso terminali. Mandibulae labro adpressae, sub lanceolatae, basi angustae corneae, deinde dilatatae, diaphano membranaceae: altero margine integro, altero fisso - ciliato, medio fusco opaco. Labrum membranaceum quadrangulum testaceum, antice posticeque diaphanum, medio corneo - opacum, nervo medio nigricante, antice ciliatum. Palpi posteriores triarticulati, undique setosi, articulis primo et tertio brevissimis. Mentum corneum fuscum, scabrum, quadrangulare, apice emarginatum. Labium membranaceo - diaphanum, rhomboideum pallidum, costa media cornea, apophysibus duabus cruriformibus corneis membranaceo - alatis affixum, quae musculorum vices agere videntur. Antennae nigrae: articulo primo longissimo, reliquis rotundatis, ultimis tribus concavo - lamellatis clavam constituentibus. Clypeus ater opacus impressio punctatus, utrinque marginatus, subtriangulus, antice sublunatus submarginatus subreflexus, lineis duabus elevatis oblique subsinuato tendentibus, alteraque media recta decurrente. Hae lineae in variis speciminibus mox argutae, mox obsoletae deprehenduntur. Oculi minuti, opaci, aterrimi, horum superficies multo reticulatior ac in *Ateucho sacro*. Thorax transversus convexo



pulvinatus ater, subnitens, punctis plurimis impressis, utrinque reflexo marginatus: marginibus subangulato-rotundatis: postice integer: linea dorsali abbreviata obsoleta, foveolaeque utrinque marginali impressa. Sunt specimina, in quorum thoracis postico, non raro puncta quatuor, vix nisi lentis ope visibilia observantur. Elytra longitudine abdominis, atra lucida, disco subdepressa, ad futuram postice, apiceque gibba, obsolete 6-7 striata, punctisque plurimis impressis irrorata: apice ad marginem futurae et in gibbositate scapularum obsolete transversim rugosa: margineque laterali utrinque apice late sinuato - excisa. Sutura glabra nitida. Pedes atrii subnitidi nudi elongati: femora antica reliquis crassiora compresso-clavata: margine antico bis carinato, carina altera ante apicem in spinam excurrente, altera interdum ciliata, interdum calva: femora media remota, postica margine simpliciter acuta inermia. Tibiae anticae elongatae, bis, interdum ter, cum obtuse, tum acute apice dentatae: dentibus duobus prioribus semper acutioribus: utrinque per totam longitudinem crenulatae l. obtuse ferratae: spina apicis solitaria: tibiae mediae breviores reliquis: posticae admodum elongatae et per totam longitudinem utrinque mox obtusius, mox argutius spinuloso-crenulatae: interdum inaequaliter ferratae. Tarsi breviusculi quinquearticulati, utrinque spinulosi, nigricantes; ungula fusca glabra.

Variat *Ateuch. pilul.* magnitudine, thorace elytrisque magis vel minus nitidioribus. Habitat in Germania australi, Italia, Gallia, Hungaria, Bohemia, Helvetia; in stercore animalium degit, eoque globulos confectos pedibus posticis volvit, et more conspicerum ovulum in hos deponit, et sepelit.



Vtrumque sexum eruere difficile adhuc esse videtur. An femorum anticorum spinosa conditio huius testimonium?

---

Vier Fressspitzen. Die zwey vordern sind rückwärts mitten auf den Kinnbacken befestigt, und viergliedrigt. Das erste Gelenk ist überaus klein, das zweyte und dritte ist dreieckigt, ziemlich dicke, und länger als das erste, das vierte ist länger als alle, gleichbreit, fast walzenförmig: alle sind jedoch ungleich glatte, braun, und, wie es mir vorkam, ohne Härchen. Die Kinnbacke ist hornartig, ungleichseitig, braun, borstig, stumpf an der Spitze: die andere Seite ist membranös geflügelt, und auf ihrer Spitze steht ein stumpfer rauchhäriger schwammartiger Lappe. Die Kinnladen sind fest an die Lezge gedrückt, von fast lanzettförmigen Umrisse, an der Basis sind sie schmahl, hornartig, werden aber nachher breiter, und endigen sich mit einer durchscheinenden Membran, deren einer Rand ungetheilt, der andere aber zerchliffen — gefranzt ist. Diese Membran ist in ihrer Mitte braun und folglich weniger durchscheinend. Die Lezge ist häutig, viereckigt, ockergelb, vor- und rückwärts durchscheinend, in der Mitte hornartig folglich undurchscheinend, mit einem durch eben diese Mitte gerade durchlauffenden schwärzlichten Nerven: vorwärts ist sie am Rande ungemein zart gefranzt. Die hintern Fressspitzen sind dreigliedericht, fast ganz mit Borsten oder steifen Härchen bedeckt: das erste und dritte Gelenk ist am kürzesten. Das Kinn ist hornartig, schwarzbraun, rauh, viereckigt, und oben ausgeschnitten. Die Lippe ist eine raufenförmige bleichfärbige dünne durchscheinende Membran, in der Mitte mit einer hornartigen Rippe, und an zwey schenkelförmige hornartige Fortsätze, die membranös, geflügelt sind, und die Stelle der Muskeln zu vertreten scheinen, gefügt. Die Zühlhörner sind schwarz: das erste Gelenk ist das längste, die übrigen sind rundlicht, die letzten drey stellen eben so viele ausgewölbte Lamellen vor, die über einander liegend, die sogenannte Keule bilden. Der Kopfschild ist schwarz glanzlos, mit vielen Hohlpunkten, an beyden Seiten gerandet, so ziemlich dreieckicht, vorwärts halbmondförmig contourirt, daselbst etwas ausgeschnitten — zurückgeschlagen, und auf seiner Fläche mit zwey erhabenen schief lauffenden etwas ausgebogenen Streifen, zwischen welchen noch eine dritte nur geradere läuft, versehen. Diese Streifen sind an verschiedenen Exemplaren, bald mehr, bald weniger stark: oft



so gar sehr unmerklich. Die Augen sind klein, trüb, rabenschwarz, ungleich bemerklicher facetirt als an dem Ateuchus sacer. Das Bruststück ist breiter als lang, gewölbt, schwarz, einigermaßen glänzend, mit sehr vielen Hohlpunkten versehen, und an beyden Seiten aufgeschlagen gerandet: die Ränder selbst sind edicht — rundlicht. An dem hintern Rande ist das Bruststück so ziemlich einförmig eben, auf dem Rücken mit einer kurzen verblichenen Linie, und an beyden Seiten mit einem Grübchen gezeichnet. Es giebt aber auch Exemplare, welche hinterwärts auf dem Bruststücke, nicht selten vier, jedoch fast ganz unmerkliche Hohlpunkte haben, die sich nur durch das Suchglas wahrnehmen lassen. Die Flügeldecken sind so lange als der Unterleib, wenn sie gleich denselben nicht ganz bedecken, ausserdem schwarz, mit einigem Glanz, in der Mitte etwas flach, hinterwärts auf der Naht, so wie gegen ihr Ende zu höckericht, verblischen sechs bis siebenmal gestreift, und mit sehr vielen Hohlpunkten übersät. An ihrer Spitze hart an dem Rand der Naht, so wie auf den Schultern haben sie einige Querrunzeln, ganz vorzüglich und deutlich sind sie aber am obern Seitenrande sehr breit buchtig ausgeschnitten. Die Naht ist glatt und glänzend. Die Füße sind schwarz, etwas glänzend, fahl und ziemlich lange. Die Vorderschenkel sind nicht nur viel stärker als die übrigen, und zusammengedrückt keulenförmig, sondern auch an ihrem vordern Rande mit einer doppelten kielartigen Streife erhöht, so daß die eine, bevor sie die Spitze erreicht, sich in einen zahnartigen Stachel erhebt, die andere hingegen oft mit, auch ohne Härchen gebrämt ist. Die Mittelschenkel stehen etwas weniger genähert als die vordern aneinander. Die hintern haben einen einfachen zahnlosen Rand. Die Vorderschienbeine sind ziemlich lange gestreckt, zwey, oftmals auch drey, bald mehr bald minder spizig gezähnt. Die beyden vordern Zähne sind fast immer am spizigsten; ausserdem sind sie noch an beyden Seiten ihre ganze Länge herunter zart gekerbt, oder stumpf sägeartig, und mit einer einzelnen Stachelspitze sich endigend. Die mittlern Schienbeine sind kürzer als die übrigen: die hintern sehr langegestreckt, und ihre ganze Länge herunter, bald stumpfer, bald spiziger an beyden Seiten spizig gekerbt: zuweilen sind sie auch ungleichförmig sägeartig. Die Fußblätter sind ziemlich kurz, fünfgliederig, an beyden Seiten zart stachlicht, schwärzlicht. Das Häkchen ist braun und glatt.



Dieser Pillenkäfer ändert am meisten in Hinsicht seiner verschiedenen Größe ab. Dieß wird schon durch die von mir angegebenen Dimensionen, so viel es sich hier thun ließ, erweislich gemacht, und die ich mit noch mehrern gar leicht hätte vermehren können. Ob jedoch aus diesen verschiedenen Größemaassen, auch auf den Unterschied des Geschlechts mit Sicherheit geschlossen werden dürffe, oder könne, will ich nicht geradezu behaupten. Indessen hat dieser Pillenkäfer den merkwürdigen und wenigstens an nicht sehr vielen Arten (g) dieser Gattung bemerklichen Umstand, der gezähnten Vorderschenkel an sich, der etwa, wie bey andern Gattungen sonst üblich, auf den Unterschied des Geschlechtes hinweisen könnte: allein auch dieser scheint nicht hiezu hinreichend zu seyn, weil wenigstens ich, an den sehr vielen Exemplaren, die ich untersuchen konnte, solchen immer, wenn gleich mehr oder weniger erheblich antraf.

Unter den in Betracht ihrer Größe abändernden Exemplaren, wird man auch solche bemerken, welche auf dem Bruststück, sowohl als auf ihren Flügeldecken, mehr und weniger glänzen. Es giebt Exemplare die ungemein glänzen, aber auch ganz glanzlose. Auch dieser Umstand scheint kein sicheres Resultat, für oder wider dieses oder jenes Geschlecht zu verstaten. Die Entdeckung der männlichen Zeugungstheile, oder der Eyerchen in dem Unterleibe, ist wohl immer das sicherste Mittel, über den Geschlechtsunterschied zu entscheiden. Dem noch fanden sich in denjenigen Individuen Eyerchen, welche nicht nur den stärksten Randbug an den Flügeldecken hatten, sondern deren Flügeldecken auf ihrer Fläche an den Rändern der Naht die meisten Querrunzel, an ihrer Spitze die stärksten höckerartigen Erhöhungen hatten, und besonders an ihrem äußersten Ende breiter als gewöhnlich waren. Doch waren auch an diesen, die stachelartige Zähne an den Schenkel ungleich stärker und spiziger als an andern.

Das Vaterland ist nicht nur das südliche Teutschland, ein großer Theil von Italien, Frankreich, sondern auch Ungarn, Böhmen, ein Theil der Schweiz, so wie die Gegend um Genèv. Der Aufenthalt ist in dem Auswurf verschiedener Thiere, aus welchen das Weibchen, mittels seiner langgestreckten

§ 3

Hinter-

(g) Doch hat der *Ateuchus flagellatus* Fabric. n. 22. so wie der *Scarabaeus Mopsus* Pallas 1c. inf. ross. tab. A. fig. 3. eben so beschaffene Vorderschenkel.



Hinterfüße, ziemlich große runde Kugeln, in Willenform zu wälzen weiß, da rein ein Ey zu legen, und dasselbe wieder unter die Erde zu bringen. Diese Methode der aus dem Ey zu tretenden Made, sogleich Nahrung zu verschaffen, ist bekanntlich mehreren dieser Gattung und Familie eigenen Arten gemein. Manche wählen hiezu den Schaafdünger, als eine schon zu diesem Behufe von der Natur hergegebene Form. (h)

Ob derjenige *Scarabaeus pilularius*, den der seel. Archiater von Linné sowohl in dem System. Nat. n. 40. p. 550. als auch vorher schon in dem Mus. Lud. Vlr. 17. p. 19, genau genug beschrieben hat, eben derjenige sey, den ich hier abgebildet, und mit Hinzuziehung derjenigen Autoren, die, wie ich glaube, diesen nehmlichen vor sich gehabt haben, genannt, muß ich aus Gründen bezweifeln, die ich unmittelbar aus der Beschreibung des Herrn Archiaters selbst zu nehmen, mir erlauben muß. — Kein Exemplar, das ich gesehen, hatte an seinem Unterleibe einen metallähnlichen Glanz (i). Kein Bisamgeruch. Linné konnte doch wohl kein anders als ein trockenes lebloses Exemplar vor sich haben, und doch den Bisamgeruch bemerken (k). Andere, wie Prynßler hatten frische lebendige Exemplare, und erwähnen dieses Umstandes nicht. Was Linné ferner von seinem *pilularius* sagt (l), kan ich eben so wenig an diesen bemerken. Hiezu kommt der Umstand, daß Linné seinen im Mus. L. V. beschriebenen nordamerikanischen pilular., den die Catesbysche Figur darstellen soll, im S. N. mit seinen aus Italien und Spanien ihm geschickten Individuen, vereinigt: eine Vereinigung, welche diesen Umstand meinem Bedünken nach verwirrt macht. Ausserdem kann ich fast für ausgemacht annehmen, daß Linné, wenn er diesen gegenwärtig von mir beschriebenen und abgebildeten *pilularius* vor sich gehabt hätte, kaum so merkwürdige diagnostische Kennzeichen übersehen haben würde, wie die Querstreife auf dem Kopfschild, wie der buchartige Ausschnitt am obern Flügeldeckenrande, wie die

(h) Donndorf in Gözeng fortgesetzter europ. Faune hat diesen Umstand ausführlicher beschrieben. S. den 3ten B. S. 113.

(i) *Corpus subtus aeneum.* Linn. S. N. l. c.

(k) *Moschum fragrans.* Mus. Lud. Vlr. l. c.

(l) *Caput subrotundum, plano convexum: elytra postice rotundata: tibiae anteriores quadridentatae.* M. L. V. l. c.



die stachelartigen Zähne am Vordersehenkel, die drenzähligen Vordersehenbeine, die langgestreckten Hinterfüße sind. Dieses zusammengenommen, wird, glaube ich, mich rechtfertigen müssen, wenn ich Linné's *pilul. Mus. Lud. Nr.* hier übergangen, und in diesem, einen von diesen sehr verschiedenen Pillenkäfer erkenne, wenn es gleich möglich ist, daß der des S. N. ohngeachtet seines verschiedenen Vaterlandes, mit jenem ein und eben dieselbe Art seyn könne.

Ungleich weniger Schwierigkeiten finden sich, wenn man den Fabricius'schen *A. pilular.* mit dem *Bousier à couture* des Geoffroy. n. 8. zu vereinigen sucht, wenn ich gleich ehehin beide, durch die Synonymenstellung des Herrn Prof. Fabricius irre geführt, getrennt habe (m). Nimmt man die Synonymen aus Linné's Schriften, und etwa auch das aus Pallas russischen Käfern hinweg, so können doch sügliche die andern bleiben. Es ist außer diesem kaum glaublich, daß Herr Prof. Fabricius, einen von den Geoffroy'schen *Bousier* etc. ganz verschiedenen *Ateuchus* unter seinem *pilul.* sollte angezeigt haben, zumal er demselben, ein jenem ganz vorzüglich zukommendes Merkmal, zueignet (n). Eine andere Frage ist, wenigstens mir, diese, ob *Scar. Mopsus Pallas* mit unter diesem *pilul.* gerechnet, oder für eine eigene für sich bestehende Art gehalten werden dürffe? Abgerechnet die stets platte Form des Bruststückes und der Flügeldecken, das immer und unabänderlich glanzlose an demselben, die ganz verschiedene Skulptur und Einprägung der Punkte und Streifen auf denselben, bleiben dem Pallas'schen *Mopsus* doch die Querstreife auf dem Kopfschild, die buchtartige Ausbiegung an dem obern Flügeldeckenrande, samt den stachelartigen Zähnen an den Vordersehenkeln, als eben so viele charakteristische Eigenheiten des *pilular. Fabr.* so daß es fast verzeihlich wird, wenn man denselben, als eine *speciem intermediam* zwischen den *pilular. sinuat.* einreihet, wenigstens eben so verzeihlich mir, wenn ich ihn vor der Hand für noch nicht qualificirt genug halte, weder diese Stelle einzunehmen, noch unter dem *pilularius Fab.* standhaft sich zu erhalten.

Ben

(m) Drury meine Uebersetz. 1. Th. p. 133.

(n) Donndorf in Götzens fortgesetzt. Jaune, setzt es so gar geradezu unter die bey diesem Käfer obwaltenden Irrthümer, wenn man den *pilul. Fabric.* von dem Geoffr. für verschieden erklärt. 8 Th. p. 114.



Bey dieser Gelegenheit muß ich mir die Erwähnung noch eines Umstandes erlauben, die wie ich glaube, aus mehrfacher Hinsicht, hier an ihrem rechten Orte steht. Verschiedene angesehene, zum theil als classisch geschätzte naturhistorische Schriftsteller haben von jeher geglaubt, es gehöre mit zur besondern Aufklärung des Gegenstandes von dem sie sprachen, wenn sie auch dasjenige, was sich hierüber, wenn gleich oft auf die entfernteste Weise, in den ältern naturhistorischen Autoren des Aristoteles, Helian, Dioskorides und Plinius des ältern u. auswittern lasse, hier mit anbrächten. Es gehört gar nicht hieher, abermals das Studium dieser Autoren zu empfehlen, zu billigen, oder dasselbe zu rechtfertigen. Nur erkenne man auch den Wunsch für zulässig und gerecht an, es mögten nur Männer, wie Schreber, Schneider und Lichtenberg, Naturalien von welchen Aristoteles, Helian, Dioskorides und Theophrast sprachen, nur im Systema Naturae nachweisen, oder, wenn andere es wagen sollten, dies nur mit weiser Besonnenheit, und nüchterner Bedachtsamkeit geschehe, und man wenigstens nicht mit übelberathener Vorschnelle hierüber absprache. Ich berge es nicht, daß auch ich überzeugt bin, es gehöre ungemein viel Sachkunde, Sprachkenntniß und Beurtheilung hiezu, wenn man anders darauf ausgeht, an der Hand der untrüglichen Gewißheit, der Wahrheit, die Geschichte seines natürlichen Gegenstandes bis zu seinem Ursprunge in ununterbrochenen Relationen zu verfolgen. Vermuthungen täuschen, und leiten irre; oder wenn sie dieß nicht sollen, wenn sie bloß Winke seyn sollen, dem Gegenstande von dem die Rede, auf das Reine zu kommen, so müssen sie auch nur als bloße Vermuthungen, nur als Winke angegeben werden.

Der seel. Archiater von Linné hat eine Stelle aus *Aristot. hist. animal.* und *Plin. hist. nat.* bey seinem *pilular.* angegeben, woraus man noch immer schließt, daselbst seye auch die Rede von diesem *pilul.* Allein es ist aus Gründen, die mich zu weit von meiner Absicht führen würden, annehmbar, daß daselbst nicht gerade dieser *pilular.* gemeint seyn konnte. War dieses Citat aber nur Wink von dem seel. Archiater, um zu erutren, was — wenigstens Plinius der ältere, für einen *Pilulenkäfer* gemeint habe, so ist es freylich nur sehr zu beklagen, daß niemand bisher diesen Wink weder verstanden, noch auf diesen Umstand die mindeste Rücksicht genommen, selbst niemand, daß ich es wüßte, sich die kleine Mühe gegeben, nur diese Stelle aufzusuchen, um nachzulesen, wie sich Plinius hierüber geäußert und ausgedrückt habe. Würde dieses geschehen seyn, so müste man auch gefunden ha-  
 ben,

ben, daß selbst bey Linné dieses Citat: *Plin. nat. II. 34.* irrig seye, welches man bisher immer mit großer Genauigkeit nachgeschrieben.

Diese Stelle indessen, in welcher Plinius der ältere, von einem Pillenkäfer spricht, steht *hist. nat. libr. XI. cap. 28. de pennis insectorum, et scarabaeorum generibus*, und ist folgende: *"aliud rursus eorum genus, qui e fimo ingenteis pilas aversi pedibus volutant, parvosque in iis contra rigorem hyemis vermiculos foetus sui nidulantur. — C. Plin. Secund. Histor. mundi. Lugduni apud Petr. Santandream. 1582. fol. p. 202.*

Auf der fünften Kupfertafel ist dieser Pillenkäfer abgebildet, und zwar bey

- Fig. 5. in natürlicher Grösse  
 6. mit ansehnlicher Vergrößerung  
 7. Im Profil  
 8. das Bruststück mit dem Kopfschild vorwärts gestellt.



GEOTRVPES PUNCTATUS.  
Der punktirte Erdfäfer.

Tab. VI. Fig. 1. 2.

*GEOTRVPES punctatus*: thorace inermi punctato, capitis clypeo integro: dentibus duobus elevatis obtusis. FABRIC. System. Eleuther. T. I. n. 63. p. 18. Entom. system. Supplem. n. 57. pag. 21.

*SCARABAEVS punctatus*. FABRIC. Entom. system. T. I. n. 64. p. 21.

*SCARABAEVS punctatus*. ROSSI Faun. etrusc. T. I. n. 19. p. 9. et Mant. n. 2. p. 5. edit. Hellw. T. I. n. 19. p. 9.

*SCARABAEVS punctatus*. Devill. Entom. I. 40. 88. tab. I. fig. 3.

<i>Mensurae.</i> Longitudo a capite ad anum	Lin.	11	:	10	:	$9\frac{1}{2}$	:	$8\frac{1}{2}$	:	7
clypei						$1\frac{1}{2}$				
thoracis						4				
elytri						$6\frac{1}{2}$				
Latitudo capitis						$2\frac{1}{2}$				
thoracis						$5\frac{1}{2}$				
elytrorum						$6\frac{1}{2}$				

Palpi quatuor: anteriores quadriarticulati, articulo primo brevissimo, secundo longiori, tertio breviori, quarto longissimo clavato: omnibus glabris ferrugineis. Maxilla sublinearis cornea obscure fusca, fetosa, apice inaequaliter dentata: denticulis apicis fissis. Mandibulae prominulae os arcte claudentes, obscuro fuscae, latae, validae, basi gibbae, subtus excavatae, apice obtuse tridentatae, dentibus inaequalibus parum inflexis. Mentum corneum obscure fuscum, fetis longis rufis tectum, apice angustatum submarginatum. Palpi posteriores triarticulati: articulo primo et secundo brevioribus, tertio longiori. Antennae admodum breves glabrae, ferrugineae, articulo primo  
maiori

maiori fetis rufis obvallato, reliquis minutis rotundatis, ultimis tribus ovato-lamelliformibus superimpositis clavam saepius ciliatam constituentibus. Clypeus ater opacus, punctis elevatis scaber, antice angustatus emarginato-reflexus: occipite tuberculis duobus elevatis, qui in altero sexu magis approximati et fere oblitterati, tunc lineam simplicem abbreviatam elevatam efficiunt. Thorax ater in aliis nitidus, in aliis opacus, convexus, antice rufo ciliatus, marginatus, punctis plurimis impressis, tuberculo utrinque marginali admodum obsoleto, nec in omnibus speciminibus manifesto. In aliis speciminibus et quidem in maioribus, thoracis linea dorsalis obsoleta, foveolaeque utrinque dorsalis aequae obsoleta observatur. Margo posticus subinteger, impressione utrinque notatus. Scutellum laeve, triangulare, apice punctis aliquot excavatis. Elytra atra, s. obscure fusca, convexa, marginata, mox opaca, mox nitida, basi et apice gibba, ante scapulam impressa, punctis plurimis excavatis, futurae marginibus glabris: lineis tribus laevibus a basi oblique tendentibus, ante apicem coeuntibus, nunquam hunc attingentibus. Pedes nigri glabriusculi, interdum obscure fusci, femoribus anticis saepius obscure ferrugineis: tibiae anticae validae compressae 3-4 mox argute, mox obtuse dentatae, medio canaliculatae, fetis aliquot rufis stipatae, ante apicem spina solitaria brevi armatae: mediae et posticae inaequaliter 2-3 dentatae. Femora omnia valida lata compressa: postica latiora subtus linea marginali impressa, alteraque marginali punctata rufo setosa. Tarsi quinquearticulati fusci, rufo setosi, Corpus subtus glabrum nitidum: pectore villositate rufa hirsuto.

Marem a Femina dignoscere certo hactenus nondum datum est.



Maiora et obefiora Specimina, clypeo manifeste tuberculato, equidem feminas putem; minora et graciliora, clypeo mutico, lineola tantum elevata, mares esse contenderem.

Variat *G. punctat.*, cum magnitudine, tum nitore thoracis elytrorumque, clypeique tuberculis magis vel minus elevatis.

In omni clypeo tuberculato, semper geminum, nunquam autem solitarium tuberculum vidi.

Habitat in Italia, unde e Etruria, Neapoli, Roma plura ad me exempla missa fuerunt. In sylvaticis, hortis, sub terra degit.

Vier Fressspitzen, die vordern viergliedericht; das erste Gelenk überaus kurz, das zweite ziemlich lang, das dritte ungleich kürzer, das vierte am längsten und keulförmig. Alle sind rostfärbig und glatt. Die Kinnlade ist fast von gleicher Breite, hornartig, dunkelbraun, borstig, an der Spitze ungleichförmig gezähnt. Diese Zähne so klein und kurz sie sind, sind jedoch abermals gespalten, und zwar die obern am stärksten. Die Kinnbacken stehen etwas und dieses sehr deutlich hervor, schließen den Mund überaus feste zu, sind dunkelbraun, breit, stark, an ihrer Basis höckericht, unterwärts etwas gewölbt, an der Spitze stumpf drenzähmig. Diese Zähne sind jedoch ziemlich ungleich, und, wie es mir vorkam, etwas eingebogen. Das Kinn ist hornartig, dunkelbraun, mit langen rothbraunen steifen Härchen bedeckt, an der Spitze schmal, und daselbst einigermassen ausgerandet. Die hintern Fressspitzen sind drenghiedericht; das erste und zweite Gelenk ist ziemlich kurz, das dritte aber länger. Die Fühlhörner sind an sich ziemlich kurz, glatt, rostfärbig: das erste Gelenk ist von ansehnlicher Länge, doch ganz von rothbraunen borstenartigen Härchen bedeckt, die übrigen sind klein, rundlicht, die übrigen dren sind enrunde übereinander liegende Lamellen, welche die öfters gefranzte Keule formiren. Der Kopfschild ist schwarz, glanzlos, durch erhabene Punkte rau, vorwärts schmal zu laufend, und daselbst ausgerandet zurückgeschlagen. Auf dem Scheitel bemerkt man zwei in die Höhe stehende Höcker, welche bey dem andern Geschlechte gleich



gleichsam in eine kurze erhöhte Querlinie zusammenfließen. Das Bruststück ist bey einigen Individuen schwarzglänzend, bey andern hingegen ohne Glanz, gewölbt, vorwärts rothbraun zart behaart, mit einem Rande, höhlpunktirt, und an beyden Seiten mit einem unansehnlichen Höckerchen versehen, das noch überdem nicht an allen Exemplaren gleich sichtbar ist. Es giebt welche, und zwar solche die unter die größten gehören, bey welchen auf dem Bruststück eine verblichene Längsline bemerkt wird, und zugleich neben derselben ein auf beyden Seiten liegendes meist sehr unansehnliches, doch sichtbares Grübchen. Der hintere Rand ist ganz und ungetheilt, doch sind zwey in einiger Entfernung von einander liegende Vertiefungen daran nicht zu verkennen. Das Schildchen ist eben, dreyseitig, und nur an der Spitze etwas höhlpunktirt. Die Flügeldecken sind schwarz, oder schwarzbraun, gewölbt, gerandet, bald glanzlos, bald glänzend, an der Basis und Spitze höckericht, an der Schulter etwas eingetieft, stark höhlpunktirt, und nur an dem Rande der Naht glatt. Drey glatte Streifen laufen auf jeder, in schiefer Richtung abwärts, begegnen sich, bevor sie die Spitze derselben erreichen und vereinigen sich daselbst mit einander. Die Füße sind schwarz, so ziemlich glatt, oftmals dunkelbraun. Die Vorder-, schenkel sind gewöhnlich dunkelrostfärbig. Die Vorderschenkelbeine sind stark, zusammengedrückt, drey, bis viermal bald scharf, bald stumpf gezähnt, in der Mitte rinnenartig ausgetieft, mit mehreren rothbraunen Borsten besetzt, und an der Spitze mit einer einzelnen kurzen Dornspitze bewaffnet. Die mittlern und hintern sind ungleich zwey, bis drey mal gezähnt. Jeder Schenkel ist stark, breit, zusammengedrückt; die hintern sind ungleich breiter, und unterwärts mit einer eingetieften Randlinie, nebst einer andern Punktlinie, die mit rothbraunen Borsten besetzt ist, versehen. Die Fußblätter sind fünfgliederig, braun, rothbraun borstig. Der Unterleib ist glatt, glänzend: nur die Brust ist rothbraun rauchhärig.

Wodurch man das Männchen von dem Weibchen unterscheiden können scheint man noch nicht mit Gewißheit angeben zu können; größere und dickbauchigere Exemplare, mit sehr deutlichen Höckern am Kopfschilde, mögte ich wohl für Weibchen, hingegen die schlankern minder größern, mit der erhöhten Querlinie, statt der Höcker, für die Männchen halten. Allein, so sehr die Analogie dieser Hypothese zu statten kommt, so wenig will sie sich bey einer etwas genauern Ansicht und Untersuchung, bey dieser Käferart anwendbar finden lassen.



lassen. Alle Exemplare dieses Käfers, die ich zu sehen Gelegenheit gehabt, und deren Anzahl nicht geringe war, habe ich durchaus mit zwei Höckern auf dem Kopfschild gezeichnet, nur mehr oder weniger elevirt gesehen, und die Untersuchung des Unterleibes an sehr vielen derselben, hat mich gelehrt, daß ich vielleicht nur Männchen vor mir hatte. Es scheint also, daß das Weibchen dieser Species entweder sehr selten seyn müsse, oder vielleicht, wie es öfters zu gehen pflegt, wegen einiger Abweichungen, für eine eigene Art gehalten werde.

Ich weiß, daß in verschiedenen teutschen Sammlungen, dieser Käfer unter dem Namen des Geotr. *Monodon*. vorkomme, und ich erinnere mich gar wohl, daß mir auch Exempl. unter diesen Namen zugesendet worden sind. Beide haben zwar eine nicht abzustreitende Aehnlichkeit mit einander, und es ist vielleicht möglich, daß künftige Wahrnehmungen, auch beide einst im Systeme vereinigen. Nur gegenwärtig, und zumal ich Herrn Prof. Fabricius Bestimmung gefolgt bin, konnte ich mich nicht füglich von dessen Nomenclatur entfernen, um so weniger, da ich in dessen Citat aus Rossis faun. etrusc. die Bestätigung seiner Angabe finde. Nur der Ausdruck *clypeo integro*, und *nullo modo reflexus, nec emarginat.*, hätte mich verleiten können, hievon abzugehen, wenn ich nicht Individuen dieser Käfer gesehen hätte, deren Kopfschild wirklich zu wenig ausgerandet war, um ihn unter die ausgerandeten zu rechnen, ausserdem die prätendirte Anwesenheit der zwey Höckerchen der Sache den Ausschlag gab. Nicht minder kommt auch, zumal sich die übrigen Umstände vereinigen, das Vaterland dieses Käfers in billige Rücksicht.


Dieses ist nicht nur nach der Angabe des Herrn Prof. Fabricius, Italien, sondern meine ältern Erfahrungen bestätigen solches vollkommen. Bevor ich von Herrn Rossi, durch Einsendung mehrerer Exemplare in den Stand gesetzt wurde, seinen punctulatus kennen zu lernen, besaß ich schon eine nicht unbedeutende Anzahl anderer aus Florenz, Rom und Neapel.

Ob der Aufenthalt derselben in Gärten und Wäldungen seye, seine Verwandlung unter der Erde vollbringe, will ich nicht bezweifeln, so wenig ich auch hierüber Erfahrungen habe.

Auf der sechsten Kupfertafel ist dieser Erdfäfer abgebildet, und  
zwar unter

- Figur 1. in natürlicher Größe, und  
2. mit sehr starker Vergrößerung.





ATEUCHUS SACER.

Der heilige Dungkäfer.

Tab. VI. Fig. 3. 4. 5.

*ATEUCHUS sacer*: clypeo sexdentato thorace inermi crenulato, tibiis posticis ciliatis elytris laevibus. FABRIC. System. Eleuther. T. I. n. 1. p. 54.

*SCARABAEUS sacer*. FABRIC. Syst. Entom. n. 109. p. 28. Spec. Inf. T. I. n. 139. p. 31. Mant. Inf. T. I. n. 259. p. 16. Entom. system. T. I. n. 205. p. 62.

*SCARABAEUS sacer*: exscutellatus, clypeo sexdentato, thorace inermi crenulato, tibiis posticis ciliatis, vertice subbidentato. LINN. Syst. Nat. n. 18. p. 545



p. 545. ed. XIII. n. 18. p. 1554. *Mus. Lud. Vlr.* p. 13. n. 11. *Amoen. Acad.* T. VI. tab. III. fig. 170. 14.

*SCARABAEVS crenatus.* DEGEER. *Inf.* T. VII. n. 36. p. 226. tab. 47. fig. 18.

*SCARABAEVS sacer.* OLIV. *Inf.* I. 3. 150. 183. tab. 8. fig. 59.

*SCARABAEVS sacer.* HERBST *Naturg.* der Käf. T. II. n. 97. p. 304. tab. 20. fig. 2.

*STEPHANOIDES minor et maior.* VOET *Coleopt.* T. II. n. 39. 40. tab. 27. fig. 39. 40.

*SCARABAEVS sacer.* ROSSI *Faun. etrusc.* T. I. n. 32. p. 14. edit. *Hellwig.* T. I. n. 32. p. 15.

*SCARABAEVS tricesimus sextus.* SCHAEFFER Jc. *Inf.* Ratisb. tab. 201. fig. 3.

*SCARABAEVS sacer.* HARRER *Beschreib. d. Schäffer.* *Inf.* I. Th. n. 6. p. 22.

*SCARABAEVS sacer.* PANZER *Faun. Inf. germ.* XLVIII. 7.

— — — — — *Entom. germ.* I. n. 67. p. 17.

*ACTINOPHORVS sacer.* STVRM *Handb.* I. n. 64. p. 74. Tab. III. fig.

A - Q

<i>Mensurae.</i>	Longitudo a capite ad anum Lin.	$15\frac{3}{4}$ : 12 : $9\frac{1}{2}$
	clypei	$3\frac{1}{2}$ : 3 : 2
	thoracis	$4\frac{3}{4}$ : $4\frac{1}{4}$ : $3\frac{1}{4}$
	elytri	8 : 7 : 5
	Latitudo clypei	$5\frac{1}{2}$ : 5 : $3\frac{2}{3}$
	thoracis	8 : $7\frac{1}{4}$ : $5\frac{1}{2}$
	coleoptrorum	9 : 8 : $5\frac{1}{2}$
	Longitudo a capite ad basin elytr.	$8\frac{1}{2}$ : $7\frac{1}{4}$ : $5\frac{1}{2}$

Palpi quatuor: anteriores quadriarticulati: articulo primo minuto, secundo et tertio longioribus subtriquetris, quarto longissimo subclavato sublineari, subtus longitudinaliter canaliculato: omnibus nitidis glabris ferrugineis, setis aliquot hinc vel illinc ad basin frequentioribus stipatis: posteriores triarticulati, articulo primo cylindrico longiori, secundo subrotundo, tertio laevissimo, omnibus punctis plurimis excavatis, rufa et frequente setositate stipatis. Maxilla cornea fusca, sublinearis extus canaliculata rufo setosa,

ante apicem excavata, membrana duplici villosa spongiosa aurlenta terminali, quarum altera superior suborbiculata maior, altera inferior minor rotundata. Mandibulae fuscae nitidissimae basi lata corneae: basi antice in corniculum obtusum excurrente, postice in alium corniculum curvatum desinente: apice subfalcatae membranaceo - diaphanae, margine antico apice multifisso basi ciliato, margine postico acuto integro. Vtrinque duplex aponeurosis pedicellata, apice palaeformis adhaeret, cuius ope musculorum instar palato affigitur. Labrum membranam fuscam quadrangularem villosam, basi apiceque pallidam sistit, costa cornea medio divisam, antice ciliatam, postice corneam, in aponeurosen utrinque sublinearem excurrentem, qua velo palatino adhaeret. Mentum fuscum corneum subtetragonum arcte setosum, extus gibbum obtuse carinatum, punctisque plurimis excavatis impressum. Labium mento altius membranaceum, apice bifurcatum, cruribus pallidis diaphano - membranaceis ultra mentum porrectis, extus subfalcatis, interno margine ciliato - fissis, medio tuberculo corneo fulcratis: basi lata diaphano membranacea. Antennae fusco ferrugineae, glabrae: articulo primo longissimo sublineari angulato apice incrassato, secundo acetabuliformi, tertio longiori apice dilatato, quarto breviori, quinto sexto acetabuliformibus, iis apice breviter setosis, reliquis concavis ovatis obliquis lamellatis superimpositis, clavam villosam flavescentem constituentibus. Clypeus ater subopacus, punctis plurimis tum discretis tum confluentibus exasperatus, setisque hinc vel illinc rufis obsitus: antice depressiusculus semilunatus trilobatus: lobis continuis: lateralibus subtriangulis; margine laterali rotundato, arguto, subreflexo, apice acuto: intermedio latissimo exfertiore quadridentato, pone dentium ortum subexcavato, hinc pluri-

plurimis adpressis fetis rufis stipato: dentibus lateralibus margine angulatis brevioribus: intermediis paullo longioribus aequalibus: omnibus acutis subreflexis: dentium apicibus impunctatis: occipite elevatori, inter oculos rudimento lineae transversae elevatae subinterruptae nitidae, insignito. In aliis exemplis loco huius lineae transversae elevatae, tuberculum geminum corniforme, cum magis minus prominulum adest. Thorax non in omnibus, quae examini subiecti exemplis, idem: transversus ater marginatus punctatus. I. *Margine*. α) *antico* integerrimo, laterali et postico crenato: crenis acutis, obtusis, rarioribus, frequentioribus: crenis ad marginem posticum monilis instar seriatas: medietate marginis postici saepius integerrima. β) *lateralis*, magis vel minus rotundato, postice subsinuato, interdum subrecto. γ) *lateralis* ciliato, ciliis nigris, fuscis, brevibus, longis, interdum nullis. δ) *lateralis*, antice fere semper in acumen plus minusve acutum desinente. II. *Dorso*. α) convexo, subdepresso; antice convexo postice plano. β) opaco; lucido; nitidissimo. γ) punctis plurimis elevatis, instar pustularum miliarium, discretis, rarissime confluentibus. δ) punctis elevatis oblitteratis, excavatis intermistis. ε) linea longitudinali subcarinata, laevigata, nulla. ζ) foveola utrinque marginali, plus minusve obsoleta. η) postice foveolis quatuor: duabus in medio approximatis, duabus marginalibus: interdum his deficientibus. θ) foveolis duabus dorsalibus antice positas. ι) foveolis nullis, exceptis marginalibus. Elytra atra bismarginata, s. margine laterali canaliculato, basi tuberculo humerali, laevia, glabra, basi latiora, depresso subplana, subconvexa, medio ad suturam elevata, *striata*: 1) striis manifestis elevatis laevibus, 2) striis obsoletis et oblitteratis, 3) striis oblique tendentibus haud apicem attingentibus, 4) striis suturae proximis

ximis ad apicem excurrentibus, 5) striis ordinatis rectis 6 - 7) interiectis punctis sparsis impressis, saepius rugulis transversis ad futuram. Pedes omnes nigri, antici minus; postici magis et dense obscure rufo aut nigro ciliati: femora supra opaca, subtus nitida: antica angulata, supra subcanaliculata punctata, media et postica clavato - compressa, subtus linea punctorum impressorum ciliatorum: tibiae anticae, basi angustae, apice dilatatae, supra canaliculato hirtae, subtus excavato-punctatae, extus quatridentatae, dentibus subaequalibus, quarto interdum minuto obsoleto: interstitiis dentium crenatis: dentibus magis minusve acutis: apice spina solitaria acuta brevi subincurva: tarsis anticis, hactenus nondum in quinquaginta et ultra quae attentius vidi et examinavi exemplis, a me observatis. Tibiae mediae et posticae elongatae, angulato - sublineares, angustae, bifariam fetosae, apice spina longiori incurva acuta, Tarsi ante apicem infixi longiusculi: articulis quinque ad articulationem longe fetosis. Corpus subtus atrum, opacum, nitidum, magis vel minus hirtum: pectore hirsutiori. Pedes primi paris approximati: secundi et tertii aequali distantia femoti. Alae venis et nervis tendinosis flavae.

Mas a femina facile cornuum rudimentis, sive punctis inter oculos iis prominulis dignoscitur, quod iam haud dubie innuit b.  
a *Linne*.

Variat saepius magnitudine plus triplo minori: cum nitore thoracis coleoptorum, tum striarum elytrorum plus vel minus manifesta elevatione.

Tarsis anticis prorsus carere fertur.


Habi-



Habitat in Aegypto, Aethiopia, Palaestina, Rossia australi, Hispania, Italia, Calabria ulteriori, Gallia, in Comitatu tyrolensi australi, Hungaria et in littorali austriaco.

Degit in animalium stercore. More pilularium globos oblongos e fimo volvere, ovulumque in illos. ponere a nonnullis perhibetur.

Vier Fressspitzen. Die vordern viergliedericht. Das erste Gelenk kurz, das zweite und dritte länger und dreiseitig, das vierte am längsten, ziemlich keulförmig, fast gleichbreit, und unterwärts rinnenartig eingetieft. Alle sind glatt, glänzend, rothfärbig, hie und da mit etlichen Borsten besetzt, an der Basis am häufigsten. Die hintern sind dreigliedericht: das erste Gelenk ist ziemlich lang, das zweite einigermassen rundlicht, das dritte am längsten; alle sind mit vielen Hohlpunkten besetzt, und sehr stark mit rothbraunen Borsten bedeckt. Die Kinnbacke ist hornartig braun, fast von gleicher Breite, auswärts rinnenartig ausgetieft, rothbraun borstig, unter der Spitze gewölbt, und mit einer auf derselben befestigten doppelten zottigen schwammartigen goldgelben Membrane versehen, wovon die obere größer als die untere und fast zirkelrund, die untere aber rundlicht ist. Die Kinnbacken sind braun sehr glänzend, und an ihrer breiten Basis hornartig. Diese Basis läuft vorwärts in ein stumpfes Hörnchen aus, und verlährt sich rückwärts in ein anderes ähnliches jedoch gekrümmtes. Die Kinnbacken sind ferner nach oben zu beynahe sichelartig gebogen, durchscheinend, membranös, an der Spitze des Vorderrandes in ungezählte kleine Fasern zerschissen, und gegen unten zu gefranzt: der hintere Rand ist scharf und glatträndig. Ferner ist unterwärts an jede Kinnbacke eine doppelte Aponeurose, die einem gestielten Schäufelchen gleicht eingefügt, vermöge welcher sie gleich einem Muskel an den Gaumen befestigt ist. Die letzte ist hier nichts anders, als eine braune viereckichte zottige Membrane, die oben und unten hellfärbiger, in der Mitte durch eine hornartige Ribbe getheilt, oben gefranzt unten hornartig ist, und zu beyden Seiten sich in eine fast gleichbreite Aponeurose verlährt, durch welche sie an dem Gaumengewölbe befestigt ist. Das Kinn ist braun, hornartig, fast viereckigt, dichte mit steifen Härchen bedeckt, auswärts erhoben, daselbst stumpf kielartig, und mit sehr vielen



vielen Hohlpunkten eingetieft. Die Lippe steht über das Kinn hinaus, und bildet eine oberwärts zwischentlichte Membrane, wovon die Schenkel hellfärbig durchsichtig, auswärts fast sichelförmig gebogen, einwärts aber gespalten, gefranzt sind. In ihrer Mitte hat sie einen hornartigen Höcker, der ihr wahrscheinlich zur Befestigung dient, und ihre Basis ist eine breite durchsichtige Membrane. Die Fühlhörner sind dunkelbraun rostfärbig, glatt: ihr erstes Gelenk ist auch das längste, fast von gleicher Breite, eckigt, und an der Spitze kolbicht: das zweite becherartig, das dritte etwas länger und oben erweitert, das vierte kürzer, das fünfte und sechste wieder becherförmig und oben kurzborstig: die übrigen drey stellen eben so viele gewölbte eyrunde schief übereinander liegende Lamellen vor, welche eine rauchhärige bleichockerfärbige Keule formiren. Der Kopfschild ist schwarz, fast ohne allen Glanz, und durch sehr viele, theils einzeln stehende, theils zusammenfließende Hohlpunkte rauh, und mit hie und da stehenden steifen Härchen besetzt. An seiner vordern Helfte ist er so ziemlich eingedrückt, halbmondförmig contourirt, und in drey Lappen getheilt. Diese Lappen hängen an einander. Die seitwärts stehenden sind fast dreyeckigt, am Seitenrande rundlicht scharf, ziemlich zurückgeschlagen, und am Ende spitzig. Der mittlere ist breiter als jene, steht auch stärker herfür, und hat vier Zähne. Nicht ferne an der Auszählung ist er einigermassen wölbig, und daselbst, wegen mehrerer angebrachten borstenartigen rothbraunen Härchen borstig. Die beyden nebenstehenden Zähne sind seitwärts eckigt und kürzer, als die beyden mittlern, die einander so ziemlich gleich sind. Alle diese Zähne sind spitzig und etwas zurückgeschlagen, und an ihren äußersten Endungen ohne Punkte. Der Scheitel hebt sich etwas in die Höhe, und zeigt einen auf ihm sitzenden Ueberrest, einer beynabe unterbrochenen glänzenden erhabenen Querlinie. An andern Individuen lassen sich, statt dieser Querlinie zwey hornartige Höckerchen bemerken, deren mehr oder mindere Erhabenheit verschieden ist. Das Bruststück gewährt an verschiedenen Exemplaren, auch eine verschiedene Ansicht: breiter als lang, schwarz, mit einem Rande, punkirt. Ich will hier einige Abweichungen anzeigen. I. Rand. α) Der vordere: ohne Einkerbungen, dagegen der zur Seiten, so wie der hintere mit desto stärkeren und mehreren. Diese Einkerbungen sind spitzig, stumpf, wenige, mehrere: am hintern Rande stehen sie wie Perlen an einander: oft ist doch die Mitte dieses hintern Randes ganz glatt. β) an den Seiten: mehr oder weniger rund, nach hinten zu etwas buchtig, manchmal auch gerade. γ) an den Seiten die Fransen: schwarz, braun, kurz, lang, zuweilen gar keine. δ) eben derselbe ist fast

fast immer vorwärts mehr oder weniger spitzig. II. Rücken. α) gewölbt, oder scheinbar breit gedrückt; nur vorwärts gewölbt, und hinterwärts flach. β) glanzlos, mit einigem Schimmer; überaus glänzend γ) sehr viele erhöhte Punkte, die wie Frieselblättern einzeln stehen, nur selten zusammenfließen. δ) die erhöhten Punkte sind wie zusammengefallen, mit Hohlpunkten untermengt. ε) eine fast Kielartige Längslinie, diese geglättet, oder sie fehlt ganz. ζ) an beiden Seiten ein mehr oder minder tiefes Grübchen. η) nach hinten zu vier grübchenartige Eindrücke: zwey in der Mitte einander nahe, die andern beiden seitwärts: oft fehlen sie ganz. θ) vorwärts zwey grübchenartige Eindrücke. ι) diese grübchenartigen Eindrücke fehlen, nur nicht die seitwärts liegenden. — Die Flügeldecken sind schwarz, doppelt gerandet, oder man kann den Rand als rinnenartig ausgetieft ansehen, an der Basis ein Schulterhöckerchen, eben, glatt, breiter an ihrer Basis, gedrückt, flach, fast gewölbt, in der Mitte an der Naht bauchigt: gestreift 1) die Streifen deutlich, hoch, eben 2) undeutlich und verblichen. 3) schief laufend, nicht bis zur Spitze reichend. 4) nur die an der Naht liegenden erreichen die Spitze. 5) regelmäßig, gerade, an der Zahl 6: 7: zwischen denselben hie und da stehende Hohlpunkte: manchmal kleine kurze Querrunzeln an der Naht. Die Füße sind durchgehends schwarz, jedoch die vordern weniger. Die hintern sind stärker und dichter dunkel rothbraun oder schwarz gefranzt. Die Schenkel sind oben glanzlos, unten aber glänzend. Die vordern sind eckigt, oben beynahe rinnenartig eingetieft, punktiert, die mittlern und hintern keulförmig, breit gedrückt, und unterwärts durch eine hohlpunktierte Streife ausgezeichnet. Die Vordersehenbeine sind an ihrer Basis schmal, erweitern sich aber bis an ihre Spitze, sind oben rinnenartig steifborstig, unterwärts kielartig, punktiert, auswärts vierzähntig. Die Zähne sind so ziemlich einander gleich, nur der vierte ist zuweilen ungleich kleiner als alle übrigen, und manchmal fast ganz unscheinbar. Die Zwischenräume der Zähne sind gefeibt, bald mit mehr bald mit minder hervorstehenden Kerben. An ihrer Spitze ist eine einzelne kurze etwas gekrümmte Dornspitze eingelent. Fußblätter an den Vordersehenbeinen habe ich an, über fünfzig Exemplaren, noch nicht bemerken können. Die mittlern und hintern Schenkelbeine sind lang, gestreckt, eckigt — von fast gleicher Breite, schmal, an beiden Seiten herunterborstig, und an ihrer Spitze mit einem ziemlich langen gekrümmten Stachel bewafnet. Die Fußblätter sitzen von dem äußern Ende der Beine, und sind ziemlich proportionirt lang: sie bestehen aus fünf Gliedern, die an ihren Einlenkungen mit langen Vorsten besetzt sind. Der Unterleib ist schwarz, glanzlos,

oder



oder glänzend, mehr oder weniger steifhärte: die Brust ist dieses stärker. Das erste Paar der Füße steht nahe an einander, das zweite und dritte aber entfernter. An den Flügeln sind die ockersfarbigen flechigten Nerven oder Adern sehr deutlich zu bemerken.

Um das Männchen von dem Weibchen zu unterscheiden, muß man, ausser der freylich oft relativen Grösse des ganzen Körpers, und dem breiten gewölbten und deswegen bauchigten Unterleib, oder den schmälern flachen Umriß desselben, auch auf die Gegenwart oder Abwesenheit, der beyden gedachten, oft mehr oder weniger erhabenen Höcker auf dem Kopfschild, Rücksicht nehmen. Der seel. Archiater von Linné hat hiezu völlig unzweideutige, und sich ganz bestätigende Winke gegeben. In allen denjenigen Exemplaren, welche mit diesen Höckern versehen waren, wenn gleich oft stumpf genug, habe ich in dem zergliederten Unterleibe das zangenförmige hornartige rostbraun: glänzende männliche Zeugungsglied angetroffen: an denjenigen aber, welchen diese Höcker ganz fehlte, mehr oder weniger, doch immer wahre Eyerchen.

Ausser diesem sich auszeichnenden Geschlechtsunterschiede, varirt dieser *Ateuchus* in Hinsicht seiner Grösse ungemein: dies geben die von mir angegebenen Dimensionen zu erkennen, und die ich leicht hätte vermehren können, wenn dieser Käfer nicht in mehreren Sammlungen in mehrfacher Anzahl vorhanden. Nicht weniger varirt er auch durch seinen bald völlig glanzlosen, bald stark glänzenden Ueberzug. Es ist auffallend, wie ungemein düster schwarz eine Käferart seyn kann, und doch in andern Individuen wieder so glänzend. Am bemerkenswerthen schienen mir die Abänderungen, welche die Erscheinungen an dem Rande des Bruststückes, so wie auf dem Rücken desselben darstellen: ich glaubte, zumal ich sie sah, nicht übergehen zu sollen. Sehr sonderbar sind die auf letztern, oft so deutlichen, oft auch kaum bemerklichen, sehr oft auch ganz fehlenden Vertiefungen. Nicht weniger variren die Flügeldecken in Hinsicht ihrer Streifen: um verleitet zu werden, durch diese Wandelbarkeit auf den Geschlechtsunterschied zu resultiren, wäre an sich gewiß verzeihlich, wenn es nicht ganz evident erweislich wäre, daß ein solches Resultat irrig ausfallen müsse.

Der seel. Linné hat seinen *Sacer* unter die zweyte Abtheilung seiner *Scarabäen* gesetzt: *thorace inermi, capite cornuto* (o). Allein ich vermute, daß

daß er, wenn er gleich denselben, zwischen den *Mimas* und *didymus*, als zweifopfgehörnte gereiht hat, dennoch dieß *capite cornuto*, unter dem *vertice subbidentato* gemeint habe, welches er bald nachher in *cornuum rudimenta*, und in *puncta duo inter oculos prominula* verändert hat. So wenig ich daher außer diesen beschriebenen *tuberculis clypei*, ein *caput cornutum* an diesem *Sacer* wahrnehmen konnte, so wenig ist es mir auch bisher geglückt, an den *femoribus posticis* desselben einen *dentem obtusum* zu bemerken.

Außerst bemerkenswerth bleibt es immer, daß von mehreren aufmerksamen Entomologen versichert wird, dieser *Sacer* habe an den Vorderfüßen keine Tarsen. Ein Beweis, wie unglaublich mir anfangs diese Behauptung war, sey, daß ich den Künstler, welcher diese Malereien zu dieser Kupfertafel veranfaßt hat, veranlaßte, Tarsen an die Vorderfüße zu zeichnen, weil ich glaubte, diejenigen Exemplare die ich damals zu sehen Gelegenheit hatte, seyen durch einen Zufall, wie dies öfters geschieht, derselben beraubt worden. Es ließe sich nachgehends, als ich diese Behauptung durch sehr viele Exemplare bestätigt fand, und besonders ohnlängst auf das neue versichert, (p) daß sich dieses, noch an mehreren Individuen, als ich gesehen, also befände, dieser Umstand nicht mehr auf der Kupferplatte ändern. Mag diese Sonderbarkeit schon bei den *Oniten*, unter die gewöhnlichen charakteristischen Erscheinungen gehören, welche denselben ganz vorzüglich eigen ist, so ist sie doch unter dieser Gattung um so mehr aller Aufmerksamkeit werth, weil sich als analoges Beispiel dieselbe auch an den nächsten Verwandten des *Sacer*, dem *laticollis*, *sempunctat.* *variolos.* bewähren dürfte.

Das eigenthümliche Vaterland dieses *Sacer*, ist außer Aegypten, Aethiopien, Palästina, auch das östliche Rußland, Spanien, Italien, ein Theil von Calabrien, Frankreich, Syrien, Ungarn und das österreichische Littorale. Es ist wohl möglich, daß die Verschiedenheit so verschiedener Himmelsgegenden und Elemente, auch auf die verschiedene Größe derselben sich einen sehr beträchtlichen Einfluß vindiciren mag. Wenigstens scheinen diejenigen Individuen, welche



welche in den wärmern afrikanischen Zonen einheimisch zu seyn pflegen, sich durch eine ungleich beträchtlichere GröÙe auszuzeichnen, als die, welche in unsern temperirten europäischen Climate zu Hause sind. Der seel. Linné (q) machte hierauf schon aufmerksam.

Der natürliche Aufenthalt des *Sacer*, ist nach der Weise seiner Familien, und Gattungsgenossen, der Auswurf verschiedener Thiere, und wenn Löfling (r) *pilularius* der unserige ist, der Roskist. Wie gesagt, wenn dieses vortreflichen Mannes Käfer mit dem unsrigen der nehmliche ist, so hätte er so nach auch die Sitte der Pillenkäfer an sich, aus dem Rothe Ballen mit seinen HinterfüÙen zu drehen, und darein ein Ey zu legen. So sehr dem *Sacer* diese Geschicklichkeit zuzutrauen ist, welcher er in Betracht seiner langen HinterfüÙe allerdings gewachsen seyn kann, so glaube ich doch in der Beschreibung des seel. Löflings einen Umstand anzutreffen, den ich an unserm *Sacer* vermisse, (s) und wornach es sehr wahrscheinlich wird, daß ein anderer, mit eben dieser Eigenschaft begabte Pillenkäfer daselbst gemeint seyn könne. Ein anderer gleich achtungswürdiger Naturforscher traf, und welches sich mit mehr Wahrscheinlichkeit annehmen läßt, daß es unser *Sacer* war, denselben auf seinem Wege an, und war doch außer Stande, aller angewandten MüÙe obungeachtet, etwas von seiner Oekonomie zu entdecken. (t)

In wie ferne der Beynahme heilig, ohne diesen ehrwürdigen Ausdruck zu profaniren, einem Mistkäfer zukommen könne, läßt sich erklären, wenn man die Geschichte des alten Mythos seines ägyptischen Vaterlandes zu Rathe zieht, und daraus belehrt wird, daß wohl noch andern Thierarten, eine Art von Cultus zugestanden wurde, dessen Grund, in der astronomischen Theologie der ägyptischen Priester lag, und wornach demselben eine Bedeutung untergeschoben worden, welche so nach in einem verehrenden oder sogenannten heiligen Sinne genommen werden mußte. So, rücksichtlich dessen, findet man diesen *Sacer*,

(q) Magnitudo Scarabaei Cervi, sed latior. Mus. Lud. Ulr. l. c.

(r) Reise nach den span. Länd. S. 28.

(s) *Elytris nebulose maculatis* Loefl. n. o. S.

(t) Lepechin Tagebuch der russ. Reise 1. Th. S. 249.

Sacer, wiewol nur gar zu oft im eigentlichen Zerbilde, unter der großen Reihe der ägyptischen Hieroglyphen aufgeführt, und nicht selten unter andern mehrern auf den ägyptischen Obelisken, überhaupt in der Gallerie derjenigen Darstellungen, welche sich auf den ägyptischen mythischen Cultus beziehen. Nicht minder trifft man eine diesem Sacer ähnlich seyn sollende Figur, oft auch auf der Rehrseite ägyptischer und hebräischer Steine und Gemmen an, die deshalb den Namen, der Skarabäen, Käfersteine, oder Käferwürmer erhalten haben. Mehrere, freylich oft sehr einander unähnliche Darstellungen desselben, finden sich in des nicht selten mit einem großen Aufwande von Gelehrsamkeit träumenden Kircher's Werken, (v) so wie in dem mit Recht geschätzten des Caylus (w). Manchmal ist seine Darstellung nur so, daß man ihr nur an dem zackigten Kopfschild erkennen kann, zuweilen scheint der Kopf ganz zu fehlen, und die platte gestrichelte Käferform, bey der noch dazu der natürliche Umriß, unter die wenigen abgängigen Charaktere gehört, läßt nur den Gegenstand, den man hier hat sinnebilden wollen, errathen. Indessen giebt es doch auch solche Käfersteine, auf welchen dieser Sacer noch so ziemlich erträglich, ja bisweilen so ziemlich kenntlich angebracht ist. Einen solchen der letzten Art, habe ich hier in der obenstehenden Vignette mitgetheilt, dessen Original sich in der ehemaligen Stoschischen Sammlung befinden soll. Man bemerkt an dieser Vorstellung deutlich das zackigte Kopfschild, mit seinen Seitenlappen, und dem mittlern viermal gezähnten, zugleich mit den ziemlich hervorragenden Augen. Nicht minder auch das ringesherum gekerbte Bruststück, auf dem vier ägyptische Idole angebracht sind, und, wenn ich nicht irre, den Harpocrates, Anubis, Osyris und Isis vorstellen sollen. Auch die platten, zuweilen gestreiften Flügeldecken, sind nebst dem Kniebug der sechs Füße, von welchen man sich die beyden vordern, wie übereinander liegend denken muß, nicht gar sehr verfehlt. Es ist kein Zweifel, daß dergleichen Abbildungen und Vorstellungen ächt seyen, und die zuweilen in Mumien gefundenen Steine, welche in einer, wie es scheint religiösen Voraussetzung, absichtlich darein gelegt worden, verbürgen diese Richtigkeit ganz widerspruchsflos. Der seel. Fuesßly (x) erwähnt eines ihm bekannten Mahlers, welcher einst das Herz einer

I 2

Mumie,

(v) Athan. Kircher Oedip. aegyptiac.

(w) Recherches d'Antiquit.

(x) Magaz. für die Entom. I. Et. S. 144. u. f.



Mumie, die er zur Farbe brauchte, zerschlug, und in demselben einen solchen ägyptischen Käferstein fand, nur leider, denselben, unwissend, welche Seltenheit er hatte, verlohren gehen ließ.

Höchst wahrscheinlich ist es, daß unser Sacer auch derjenige Käfer gewesen seye, welchen Apis unter der Zunge haben mußte. (y) Warum jedoch gerade auf diesen Käfer jene Wahl fiel, ob etwa ein mystischer Sinn auf sein angebliches Ballenwälzen übertragen worden, ob in seinem Kopfschild ein halbmondförmiger Umriss, oder in den Zacken und Zähnen dieses, Sonnenstrahlen ähnliche Radien gesehen worden, um als sprechendes Symbol der Sonne, dem Apis darum unter die Zunge gelegt zu werden, weil Apis, nach einiger Meinung, selbst lebendiges Symbol des Osyris (z) war, dem nach nicht seiner selbst, sondern des Osyris wegen verehrt worden — sind Fragen, die ich zu lösen nur zu vielen Anstand finde, und mir hier bloß genügen lasse, solcher erwähnt zu haben: zumal ich schon zu lange meine Sichel in einem Felde usurpirt habe, auf dem ich nicht gesäet habe.

Auf der sechsten Kupfertafel ist dieser Sacer abgebildet, und zwar bey

Fig. 3. dessen natürliche Grösse

4. das Bruststück nebst dem Kopfschild und Vorderfüße in ansehnlicher Vergrößerung.
5. Ein Vorderfuß stark vergrößert, ohne Tarsen.

(y) Vogels Vers. über die Reliq. d. alten Aegypter und Griechen S. 175.

(z) Vogel a. a. O. S. 174.



## ATEVCHVS LATICOLLIS.

## Der breithalsigte Dungkäfer.

Tab. VI. Fig. 6. 7.

ATEVCHVS *laticollis*: clypeo sexdentato niger, elytris fulcatis. FABRICI System. Eleuther. T. I. n. 2. p. 55.

SCARABAEVS *laticollis*. FABRICI Syst. Entom. n. 110. p. 31. Spec. Inf. T. I. n. 140. p. 31. Mant. Inf. T. I. n. 160. p. 16. Entom. System. T. I. n. 206. p. 62.

SCARABAEVS *laticollis*: exscutellatus muticus niger, clypeo sexdentato, elytris fulcatis LINN. System. Nat. n. 38. p. 549. ed. XIII. n. 38. p. 1554.

COPRIS niger; capite clypeato, margine serrato, thorace lato laevi, elytris striatis. GEOFFR. Inf. T. I. n. 2. p. 89.

SCARABAEVS *laticollis*. OLIV. Inf. I. 3. 152. 185. tab. 8. fig. 68.

COPRIS serratus. FOVRCROY Entom. parif. I. n. 2. p. 13.

SCARABAEVS *jacer*. SVLZER. abgek. Gesch. d. Inf. tab. 1. fig. 3.

SCARABAEVS *laticollis*. ROSSI Faun. etrusc. T. I. n. 33. p. 14. edit. Hellwig. T. I. n. 33. p. 15.

SCARABAEVS *laticollis*. PETAGN. Inf. Calabr. n. 4. p. 2.

SCARABAEVS *laticollis*. HERBST Naturg. d. Käf. T. II. n. 198, p. 307. tab. 20. fig. 6.

STEPHANOIDES *costatus*. VOET. Coleopt. T. II. n. 41. tab. 27. fig. 41. edit. nostr.

SCARABAEVS *laticollis*. PANZER Faun. Inf. germ. XLVIII. 8.

Entom. germ. I. n. 68. p. 17.

Mensurae.	Longitudo a capite ad anum Lin.	10	:	9	:	7
	clypei	$2\frac{1}{2}$	:	$2\frac{1}{2}$	:	2
	thoracis	4	:	$3\frac{1}{2}$	:	3
	elytri	5	:	5	:	$4\frac{1}{4}$
	Latitudo clypei	4	:	$3\frac{1}{2}$	:	3
	thoracis	$6\frac{1}{2}$	:	$6\frac{1}{4}$	:	$4\frac{1}{2}$
	coleoptoror.	6	:	$5\frac{1}{2}$	:	$4\frac{1}{4}$
	Longitudo a capite ad elytra	6	:	$5\frac{3}{4}$	:	4

3 3

Palpi



Palpi quatuor: anteriores quadriarticulati: articulo primo minuto, secundo longiori, tertio breviori, quarto longissimo clavato altero latere canaliculato, apice pallido: omnibus glabris ferrugineis ad infectionem setosis: posteriores brevissimi triarticulati setis undique tecti: articulo primo maximo ovato, secundo minori, tertio minutissimo: duobus prioribus punctis plurimis excavatis. Maxilla cornea fusca setosa, altero latere membranacea: membranarum duabus villosis-spongiosis, altera supra alteram, quarum superior maior suborbiculata, altera inferior oblonga. Mandibulae concavae, fuscae nitidissimae, basi medioque corneae, apice obtusae membranaceae, antice ciliato-fissae, postice integerrimae. Labrum membranaceum pallide ferrugineum, quadrangulare, apice margine tenuissimo ciliato, medietate costa cornea. Mentum obscure fuscum, setis nigris obvallatum, medio carinatum. Labium membranaceum apice longe bifidum: laciniis ultra mentum porrectis, margine ciliatis, apice obtusis. Antennae glabrae nigro fuscae, articulo primo longissimo, 2-6 basi rotundatis, apice obtusis arcte superimpositis, reliquis tribus maioribus concavo-lamellatis, clavam ciliatam fuscam constituentibus. Clypeus ater, vertice subtriangulo, utrinque pone situm oculorum subelevato laevi, punctis raris excavato: postice ante emarginaturam punctis striisque plurimis confluentibus scaber opacus: antice semilunatus, trilobus: lobis continuis, lateralibus brevioribus subtriangulis, margine laterali subrotundato; apice acutis: lobo medio maiori dilatato quadridentato: dentibus subreflexis, intermediis duobus obtusis, lateralibus acutioribus. Oculi parvi fusci. Thorax ater nitens transversus convexus, margine laterali ciliato rotundato, utrinque crenato: antice marginatus sinuato-excisus integer, utrinque acutiusculus: postice subrotundatus medio obsolete acuminatus, margine supra punctis excavatis in seriem positis, medie-

medietate saepius impunctata: punctis dorsalibus raris in circulum positis foveolatis, moribus pulicum haud absimilibus, seu punctis cum area opaca foveolata, punctisque intermixtis absque area. Elytra atra nitida basi latiora, dorso depressa, ante apicem ad futuram gibba: utrinque marginato carinata, tuberculo humerali: sulcis septem laevibus nitidis, interstitiis impunctatis opacis. Pedes omnes nigri nitidi: femora antica clavata subcompressa; supra ad basin foveola pilis tecta; utrinque nigro ciliata, margine inferiori subcanaliculata: media et postica minus crassa, clavato - compressiora: sternum manifestum prominulum obtusum. Tibiae anticae atrae basi angustae, angulatae supra medio carinatae, utrinque pilosae, quadridentatae: dentibus tribus prioribus maioribus subaequalibus, quarto semper minori: omnibus subacutis apice rufescentibus: anticis duabus medio canaliculatis: interstitiis margine crenatis: altero margine edentulo crenato: mediis brevibus angulatis glabris utrinque ciliatis, altero margine obsolete inaequaliter dentatis, apice spina incurva: posticis elongatis bifariam setosis argutius inaequaliter dentatis, apice spina breviori obtusiori. Tarsi antiqui nondum absme visi: medii et postici quinquearticulati, ad juncturas setosi. Corpus subtus atrum nitidum: nulla hirsuties quam in pedibus et ad margines thoracis clypeique.

Praeter magnitudinem variam, nulla equidem mihi observata est notatu digna varietas.

Habitat in China *Linn.* in Italia *Rossi*: in Calabriae maritimis *Petagna*: in Gallia *Geoffroy*: in Europa australi *Fabricius*.

Degit



Degit sub terra, et in stercore vaccino: pilas e stercore conficit, quas pedibus posticis volutat, iisque ova concredit et postea sepe-  
lit, ut fimi calore excludantur. *Petagna.*

In elytris neque puncta excavata vidi, neque in tibia quinque, sed semper quatuor tantum dentes numeravi.

*Ateucho sacro* affinis, sed multis modis diversa species.

Vier Fressspitzen, die vordern sind viergliedrigt. Das erste Gelenk ist sehr klein, das zweite etwas länger, das dritte kürzer, das vierte am längsten, feilsförmig, an der einen Seite der Länge nach ausgetieft, und an der Spitze weißlicht. Alle diese Gelenke sind glatt, rothfärbig, und an ihren Absezungen steifhärigt. Die hintern Fressspitzen sind überaus kurz, drengliedrigt und überall mit steifen Härchen besetzt: das erste Gelenk ist ungewöhnlich groß, eckrund, das zweite ungleich kleiner, das dritte am kleinsten: die beyden ersten zeichnen sich durch sehr viele Hohlpunkte aus. Die Kinnbacke ist hornartig, braun, steifhärigt, und an der innern Seite mit zwey Membranen besetzt, deren eine größer als die andere, und unter der kleinern steht, diese ist beynahe kreisrund jene aber länglicht, beyde sind schwammicht zottig. Die Kinnladen sind unterwärts ausgetieft, braun, überaus glänzend, an der Basis und in der Mitte hornartig, an der Spitze stumpf, daselbst dünne, membrands, vorwärts zerschliffen gefranzt, rückwärts aber glatträndig. Die Lippe ist häutig bleichrothfärbig, viereckigt, oben wo sie am dünnsten ist gefranzt, und hat in der Mitte eine hornartige Rippe. Das Kinn ist dunkelbraun, mit schwarzen borstenartigen Härchen bedeckt, in der Mitte fleisartig erhöht. Die Lippe ist häutig, an der Spitze zweitheilig: die Lappen sind lange, stehen über das Kinn hinaus, sind am Rande gefranzt und an der Spitze stumpf. Die Fühlhörner sind glatt dunkelroth braun, ihr erstes Gelenk ist am längsten, die übrigen sind rund, leicht, oben stumpf, und stehen sehr gedrängt an einander: die drey letzten sind hohl, blätterartig, und bilden die braun gefranzte Keule. Der Kopfschild ist schwarz, am Scheitel beynahe dreneckigt, und an beyden Seiten hinter den Augen einigermaßen erhaben eben, und mit einigen Hohlpunkten versehen: an  
seinem



seinem vordern ausgezackten Rande liegen mehrere zusammenfließende Punkte und Streifen, die ihm ein glanzloses rauhes Ansehen geben: vorwärts ist er im Umrisse fast halbmondförmig, und in drey Lappen getheilt: diese Lappen sind miteinander vereinigt, diejenigen welche seitwärts stehen, sind die kürzern, fast dreyeckigt, am Seitenrande rundlicht, und oben spizig. Der mittlere Lappe ist der größere, brekt und vierzählig. Die Zähne sind umgebogen, die beyden mittlern stumpf, die seitwärts stehenden spizig. Die Augen sind klein und braun. Das Bruststück ist schwarz, glänzend, breiter als lang, gewölbt, am rundlichten Seitenrande gefranzt, und daselbst gekerbt. Vorwärts ist es gerandet, stark halbzirkelförmig ausgeschnitten, übrigens ungetheilt, und an beyden Seiten zugespizt: rückwärts ist es beynahe rundlicht, in der Mitte einigermassen zugespizt, und am Rande oben mit in Reihen stehenden Hohlpunkten versehen, die aber in der Mitte oftmals fehlen. Die auf der Mitte des Rückens stehenden Punkte sind in geringer Anzahl zugegen, stehen gleichsam im Zirkel, haben ein grubchenartiges Ansehen, und sind daher den Flohstichen nicht unähnlich, weil sie Punkte mit einem glanzlosen grubchenartigen Hofe sind. Zuweisen stehen unter denselben auch einzelne Punkte ohne Hof. Die Flügeldecken sind schwarz glänzend, an der Basis am breitesten, auf der Mitte des Rückens flach, und von ihrer Spitze auf der Naht einigermassen bucklicht erhöht. An beyden Seiten sind sie kielartig gerandet, und an den Schultern höckericht. Sieben ebene glänzende Furchen, deren Zwischenräume unpunktirt und glanzlos sind, lauffen auf jeder der Länge nach herunter. Alle Füße sind schwarz und glänzend. Die Vorderschenkel sind schwarz, keulförmig, zusammengedrückt; oberwärts an der Basis befindet sich eine grubchenartige mit Härchen bedeckte breite Vertiefung: sie sind ferner an beyden Seiten schwarz gefranzt, und am untern Rande rinnenartig ausgehölet. Die mittlern und hintern sind minder stark, nur breiter, zusammengedrückt. Der Brustknochen ist sehr kenntlich, und stumpf. Die Vorderschienbeine sind schwarz, an der Basis schmal, eckicht, oberwärts in der Mitte kielartig erhöht, an beyden Seiten haarig, vierzählig. Die drey vordern oder ersten Zähne sind die größten und einander ziemlich gleich, der vierte ist stets der kleinste. Jeder ist indessen doch spizig und an der Spitze röhlicht. Die beyden ersten oder vordern Zähne sind in ihrer Mitte rinnenartig ausgerieft, und an ihren Zwischenräumen zartgekerbt. Der andere Seitenrand hat keine Zähne, nur schwache Einkerbungen. Die mittlern sind kurz, eckicht, glatt, an beyden Seiten gefranzt, am

A

äußern



äußern Rande fast unmerklich ungleich gezähnt, und an der Spitze mit einem etwas gekrümmten steifen Stachel versehen. Die hintern sind lange, an beyden Seiten borstenartig, und ziemlich scharf ungleich gezähnt, an ihrer Endspitze mit einem kürzern und stumpfen Stachel bewafnet. Fußblätter an den Vordersehenbeinen habe ich noch nicht wahrnehmen können: an den mittlern und hintern sind sie jedoch zugegen, haben fünf Gelenke, und an diesen steife borstenähnliche Härchen. Der Unterleib ist schwarz, kahl. Nur an den Füßen und dem Rande des Kopfschildes und des Bruststückes kann man Haare bemerken.

Das Vaterland dieses *Ateuchus* ist außer dem südlichen Europa, nach der Angabe des seel. Linné, China. In nicht geringer Anzahl erhält man öfters, und dieß am gewöhnlichsten, Exemplare, aus dem südlichen Italien, woher ich selbst mehrere erhalten habe. Auch in Frankreich, und wie man nicht zweideutige Spuren hat, so wie in Deutschland ist derselbe zu Hause.

Hoher Analogie nach wird derselbe in seinem vollkommenen Zustand im Dünger angetroffen. Nach Petagnas Versicherung ist er ein wahrer Pillenkäfer, und soll gleich diesem, seine Eier in dazu geformte Kothballen legen, welches auch sehr wahrscheinlich ist.

Abänderungen ist er sehr weniger, und dazu meist unerheblicher fähig. Die vorzüglichste ist wohl die seiner verschiedenen Größe. Wenn indessen Hohlpunkte auf den Flügeldecken, und fünf Zähne an den Vordersehenbeinen unter solche abändernde Erscheinungen gehören sollen, wie man ihm zuschreiben will, so muß ich gestehen, daß unter einer sehr beträchtlichen Anzahl Individuen, die ich von diesem Käfer, fast aus jedem seines angegebenen Vaterlandes, zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe, mir noch keines von der Beschaffenheit vorgekommen sey.

Auf der sechsten Kupfertafel ist derselbe abgebildet, und zwar bey

Fig. 6. in natürlicher Größe, und bey

7. in starker Vergrößerung.



## SCARABAEVS MOBILICORNIS.

## Der Dungkäfer mit dem beweglichen Kopfhorn.

Tab. VII. Fig. 1. 2. 3. 4. Mas. Fig. 5. 6. 7. femina.

SCARABAEVS *mobilicornis*: thorace quadridentato, capitis cornu recurvo mobili. FABRIC. System. Eleuther. T. I. n. 7. p. 24. Ent. system. T. I. n. 43. p. 15. Syst. Ent. n. 32. p. 11. Spec. Inf. T. I. n. 38. p. 12. Mant. Inf. T. I. n. 40. p. 6.

SCARABAEVS *mobilicornis*. Herbst. Nat. d. Käf. T. I. n. 41. p. 293. tab. 6. fig. 6. 7.

SCARABAEVS *mobilicornis*. Paykull Faun. Suec. T. I. n. 3. p. 3.

SCARABAEVS *armiger*. Scopol. Ann. hist. nat. V. n. 16. p. 78.

SCARABAEVS *armiger*. Laichard. tyr. Inf. I. Th. n. 11. p. 18.

SCARABAEVS *armiger* v. *Hobenwarth* in d. Schr. d. Berl. G. n. F. 6. B. p. 358. tab. VIII. fig. 12. 13. 14. 15.

SCARABAEVS *armiger* v. *Hobenwarth* u. *Reiner* botan. Reif. I. B. p. 258. tab. VI. fig. 4. a. b.

SCARABAEVS *mobilicornis*. Panzer Faun. Germ. XII. 2.

		Mas.	Femina.
Mensurae.	Longitudo a capite ad anum Lin.	4	4 : $3\frac{1}{2}$ : 3
	clypei	1	1 : $\frac{7}{8}$ : $\frac{1}{2}$
	cornu	$1\frac{1}{2}$	
	thoracis	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{2}$ : $1\frac{1}{4}$ : 1
	elytror.	$2\frac{1}{3}$	$2\frac{2}{3}$ : $2\frac{1}{2}$ : 2
Latitudo	clypei	1	1 : 1 : $\frac{2}{3}$
	thoracis	2	$2\frac{1}{4}$ : 2 : $1\frac{1}{3}$
	elytror.	4	$3\frac{3}{4}$ : 2 : 2

Descriptio Maris. Palpi quatuor: anteriores quadriarticulati: articulo primo minutissimo, secundo longiori, tertio breviori, quarto reliquis longiori, apice obtuso: omnibus flavis glabris nitidis.

Maxilla flava cornea linearis, ante apicem antice aduncobidentata: apice obtusa ciliata, medio excavata. Mandibulae *inaequales* prominentes flavae: *dextra*: cornea, arcuata, bidentata, medio dilatata concava: apice bifida, lacinia dorsali obtusa denuiformi basi lata ciliata: *sinistra*: cornea simplex, absque apophysi dorsali, triquetra arcuata, utrinque fulcata, interno margine bidentata, externo integro latiori ciliato. Mentum corneum obscure flavum, a basi lata apice angustatum submarginatum ciliatum, punctis elevatis scabrum. Palpi posteriores *quadriarticulati*: articulo primo et secundo aequalibus rotundatis minutis, tertio quartoque oblongis longioribus ciliatis; omnibus nitidis flavis. Labium membranaceum lineare pallidum apice bifidum: lacinii linearibus erectis obtusis, ultra mentum porrectis. Labrum cartilagineum adnatum transversum antice ciliatum. Antennae flavae nitidae. Articulo primo longissimo subcurvato: secundo rotundo reliquis maiori, reliquis moniliformibus, tribus ultimis lamellatis, lamellis ovatis flavis ciliatis: prima maiori fusca, reliquis minoribus, clavam magnam ovatam constituentibus. Clypeus rotundatus niger obsolete angulatus trilobus: lobo medio maiori prominente, marginato - reflexo integro: lateralibus oculis includentibus minoribus, margine laterali rotundatis: dorso punctis plurimis elevatis scaber, subtus utrinque rufo - ciliatus. Oculi globosi magni atri prominuli. Cornu in medio clypei erectum laeve filiforme apice incrassatum obtusum parum reclinatum, longitudine varia, ut plurimum thoracis. Thorax niger marginatus, punctis plurimis excavatus, margine laterali reflexo; antice rotundato - excisus postice obsolete angulatus, lateribus utrinque subrepandis: dorso medio foveolato - canaliculato, ante foveolam tuberculis duobus acutis corniformibus approximatis, utrinque late foveolato, antice impressi-  
nibus duabus distinctis. Cornua duo unciformia valida acuta reclinata  
ante



ante foveolam lateralem. Scutellum obtuse triangulum marginatum, punctis apicis raris excavatis. Elytra nigra s. obscure fusca, gibba, marginata, nitida, striato-punctata, abdomen occultantia: striis quindecim, interstitiis glabris impunctatis. Pedes omnes flavi nitidi. Tibiae anticae angulatae, pubescentes, basi angustae, extus per totam longitudinem dentatae; dentibus primis duabus vel tribus maioribus, reliquis minoribus, interdum obsoletis: apice spina acuta solitaria subrecurva: mediae et posticae angulatae inaequaliter dentatae, apice spinis duabus. Femora omnia clavato compressa. Corpus ovatum Chrysomelae aemulum, subtus flavum, albido pubescens.

Variat *mas* magnitudine, thorace elytrisque nigris, fuscis, obscure et laete flavis: clypei cornu longiori, breviori, interdum obsoleto.

*Descriptio Feminae.* Instrumentorum cibariorum fabrica et color ac in mare. Antennae ac in mare. Clypeus ater opacus, punctis impressis scaber, antice carinatus, vertice obsolete bituberculatus, utrinque pone oculos lineola abbreviata elevata longitudinali. Thorax ater opacus medio longitudinaliter canaliculatus, antice obsolete quadrituberculatus, postice utrinque foveolato. impressus: margine laterali punctis excavatis crebrioribus, dorso rarioribus. Elytra ac in mare. Eadem pedum conditio. Tibiae anticae dentibus obsoletioribus.

Variat *femina* 1. nigra, fusca, obscure flava nitida: thorace postice canaliculato utrinque puncto fusco marginali, antice lineola abbreviata, punctisque duobus obsoletis elevatis. Tibiarum anticarum dentium apex fuscus.

2. pallide flava; vertice bituberculato.



3. testacea: thorace quadrituberculato, tuberculis mediis fere coalitis: clypei centro squama triangulari, apice acuta prominula.

4. testacea: thorace quatrituberculato, tuberculis distinctioribus: mediis approximatis tamen discretis.

Habitat in Suecia, comitatu tyrolensi, alpinis carinthiacis, Carniola, Hungaria, Anglia, Austria, Germania.

In stercore degere, ex eo victum quaerere, ovulaque in eo deponere, suadet fabrica pedum, corporis, oris: neque tamen de eius oeconomia moribusque hactenus bene constat.

Das Männchen hat vier Fressspitzen; die vordern sind viergliedrig. Das erste Gelenk ist überaus kurz, das zweite etwas länger, das dritte desto kürzer, das vierte am längsten und stumpf: alle sind gelb, glatt und glänzend. Die Kinnbacke ist gelb, hornartig und von gleicher Breite, vorwärts an der Spitze hackenförmig zweizählig, auf der Spitze selbst aber stumpf, gefranzt; in der Mitte ausgetieft. Die Kinnladen sind sich nicht gleich, stehen heisfür und sind gelb, wie alle Mundtheile. Die rechte Kinnlade ist hornartig, bogig gekrümmt, zweizählig, gespalten, in der Mitte breit, daselbst ausgetieft. An der Spitze ist sie zweispaltig, und hat auf dem Rücken noch einen besondern stumpfen zahnartigen Fortsatz, der an seiner breiten Basis gefranzt ist. Die linke Kinnbacke ist hornartig, nur einfacher als die rechte, ohne jenen zahnartigen Rückenansatz zu haben; ausserdem ist sie dreiseitig, bogenartig gekrümmt, an beiden Seiten ausgetieft, am innern Rande zweizählig, und am äussern ungetheilt, erweiterter, und gefranzt. Das Kinn ist hornartig braun-gelb, unten breit, oben schmaler, einigermaßen daselbst ausgeschnitten, gefranzt, und durch erhabene Punkte rauh. Die hintern Fressspitzen sind viergliederig: das erste und zweite Gelenk sind gleichförmig, rund, klein, das dritte und vierte länger, gefranzt, alle aber glatt und gelb. Die Lippe ist häutig, gleichbreit, weißlich, oben zweispaltig: die Lappen gleichbreit, gerade, stumpf, und über

über das Kinn hinausstehend. Die Leſze iſt knorpelartig, feſtangeliegend, breiter als lang und vorwärts gefranzt. Die Fühlhörner ſind gelb, glänzend: das erſte Gelenk iſt am längſten und beynahe gebogen: das zweite rund größer als die übrigen. Dieſe ſind gleichſam perſchnurförmig aneinandergereiht, die drey letzten ſind eben ſo viele eyrunde gelbliche zartgefranzte Lamellen: von welchen die erſte bräun-größer als die übrigen beyden iſt, welche zuſammen eine verhältnißmäßſig ſehr große Keule ausmachen. Der Kopfschild iſt rundlich, ſchwarz, faſt unmerklich eckigt, dreylappigt: der mittlere Lappe iſt der größere, am weitesten hervorſtehende, am ungerheilten Vorderrande umgebogen: die Seitenlappen ſind die kleinern, ſchließen die Augen ein, und ſind an ihrem Seitenrande zugerundet. Auf ſeiner Oberfläche iſt derſelbe durch mehrere erhöhte Punkte rauh, unterwärts aber an beyden Seiten rothbraun gefranzt. Die Augen ſind kugelförmig, groß, ſchwarz, und herfürſtehend. Mitten auf dem Kopfschild ſteht ein gerades, ebenes, fadenförmiges, an der Spitze dickeres, ſtumpfes, einigermaßen rückwärts gebogenes Horn, deſſen Länge verſchieden, gewöhnlich aber von der Länge des Bruſtſtückes iſt. Das Bruſtſtück iſt ſchwarz, gerandet, mit vielen Hohlpunkten beſetzt, und am Seitenrande zurückgeſchlagen. Vorwärts iſt es ſtark ausgeſchnitten, und hinterwärts faſt unmerklich eckigt, und am Seitenrande ausgeſchweift. Auf ſeiner Mitte iſt es der Länge nach rinnenartig ausgeſtieft, an dieſer Vertiefung mit zwey einander ſehr genährten ſpizigen hörnerartigen Höckern, auf beyden Seiten mit einer grubchenartigen Vertiefung, und noch überdieß vorwärts mit zwey ſehr merklichen ähnlichen verſehen. Zwey ſehr ſtarke hackenförmige ſpizige rückwärts ſich neigende Höcker ſtehen ſeitwärts an den Seitengrubchen. Das Schildchen iſt ſtumpf dreyeckigt, gerandet, und an der Spitze mit etlichen Hohlpunkten verſehen. Die Flügeldecken ſind ſchwarz, oder ſehr dunkelbraun, buſlicht, gerandet, glänzend, geſtreift punktiert, und bedecken den Unterleib. Dieſer Streifen ſind funfzehn; ihre Zwischenräume ſind glatt und nicht punktiert. Alle Füße ſind gelb und glänzend. Die Vorderſchienenbeine ſind eckigt, zarthäutig, an der Baſis ſchmal, und auswärts die ganze Länge herunter gezähnt, nur ſind die zwey oder drey vordern oder erſten Zähne die größern, die übrigen ſind ungleich kleiner, nicht ſelten ganz unmerklich; an der Spitze ſitzt ein einzelner ſpiziger etwas gekrümmter Stachel. Die mittlern und hintern ſind eckigt, ungleichartig gezähnt, und an der Endſpiz mit zwey Stacheln bewehrt. Die Schenkel ſind ſämmtlich keilartig und  
zuſam-



zusammengedrückt. Der Körper selbst hat eine erunde Form, wie gewisse Goldhähnchen, und ist unterwärts gelb und weißlicht zartbärrigt.

Das Weibchen hat Bildung und Farbe seiner Mundtheile mit dem des Männchens gemein. Die Fühlhörner eben so. Der Kopfschild ist schwarz, glanzlos, durch viele Höhlpunkte rauh, vorwärts kielartig erhöht, am Scheitel fast unmerklich zweihöckericht, und hinter den Augen zu beiden Seiten mit einer kurzen erhabenen Längelinie versehen. Das Bruststück ist schwarz glanzlos, in der Mitte der Länge nach vertieft, vorwärts beynahe unauffällig vierhöckericht und rückwärts an beiden Seiten grubchenartig vertieft. Am Seitenrande stehen mehrere Höhlpunkte, auf dem Rücken weniger. Die Flügeldecken wie bey dem Männchen: also auch die Füße. Die Vordersehenbeine sind mit mehr der stärkern Zähnen gezähnt.

Das eigentliche Vaterland dieses Käfers sind ausser Schweden, Tyrol, die krainischen und kärnthischen Gebürge; nicht minder ist derselbe auch in Ungarn, Großbritannien, Oesterreich, und wie ich zuverlässig weiß, auch in verschiedenen Gegenden Deutschlands zu Hause.

Daß derselbe sich auch in dem Auswurf der Thiere, gleich andern Mistkäfern aufhalte, ist mehr als wahrscheinlich: welches sich schon aus der Analogie des Körperbaues, der Mundtheile, Füße u. s. w. mit ziemlicher Evidenz abnehmen läßt. Doch ist von dessen ökonomischen Verhältnissen noch manches zu erörtern übrig. Hochliegende Gegenden scheint derselbe indessen mehr als flache sandige Ebenen zu seinem Aufenthalte zu wählen.

Man kennt von dieser Käferart, mehrere Abänderungen, die dem ersten Anscheine nach ihren Grund in den verschiedenen von einander abweichenden Farben haben, deren beyde Extreme die schwarze und bleichgelbe sind, wodurch sich besonders die Oberfläche ihres Körpers darstellt. Beyde kannte ich seit mehrern Jahren, und es fehlte mir nicht an Gelegenheit beyde in verschiedenen Abstufungen zu sehen, und zum theil selbst zu erhalten. Doch nicht sowohl das so bemerkbare und fast so offenbar distinguirende Kolorit konnte mich anfangs bestimmen, beyde Spielarten die schwarze und bleichgelbe für eben so viele eigene Arten anzunehmen, als vielmehr die an der bleichgelben bemerkte so sehr von der schwarzen abweichende

weichende Bildung des Kopfschildes und Bruststückes. Hiezu kam, daß ich nicht nur durch die Aeußerung des Herrn Prof. Fabricius in seiner *Entom. systematica* I. n. 83. a) bey Anführung seines *Scarab. testacei*, — forte varietas *Sc. mobilicornis* foem. verleitet wurde, in dieser bleichgelben Spielart des *Sc. mobilicornis*, dessen *Sc. testaceus* möglich zu glauben, sondern auch durch dessen nachher hinzugekommene mündliche Versicherung, bey Vorzeigung derselben, daß solche dessen *Sc. testaceus* auch wirklich seye, darin bekräftiget wurde. Dies zu meiner Rechtfertigung warum ich bisher so und nicht anders diese Käferart unterschied.

So verzeihlich indessen der Glaube an diese sich auf nicht unerhebliche Gründe stützende Distinktion war, so würde doch dessen Beharrlichkeit bey einer bald darauf sich ergebenden Ueberzeugung eines andern, eben so als eine Ausartung angesehen werden müssen. Mein hochgeschätzter Freund Herr Prof. Hellwig in Braunschweig, hatte die Güte schon ehebedor mir über diesen Gegenstand seine verneinende Meinung zuzusichern, und ob es mir gleich anfangs einige Mühe kostete, meinem alten Glauben zu entsagen, so konnte ich doch nachher den Gründen nicht widerstehen, die er so gefällig war, mir entgegen zu stellen. Durch dessen freundschaftliches Zutrauen wurde ich in den Stand gesetzt, eine nicht unbeträchtliche Suite aus dessen Kabinete mir zu diesem Behufe mitgetheilte Individuen des *Sc. mobilicornis* selbst zu sehen, und zugleich in diesen die fast vollständige Stufenfolge des schwarzen Männchens mit dem gewöhnlich langen Scheitelhorn, herab in den feinsten Nuancen und Uebergängen von schwarzer, dunkelbrauner, lichtbrauner dunkelgelber und lichtgelber Farbe, mit langen, kurzen, sehr kurzen fast unmerklich zum Höcker herabgesunkene Horne, wahrzunehmen: wodurch ich dann vollends überzeugt wurde, daß ich in der bleichgelben Art, nur eine Spielart des gedachten *Sc. mobilicornis* vor mir hatte.

Ohngeachtet ich daher auf dieser Kupfertafel nur eine dieser Spielarten dieses Käfers abgebildet zu haben glaube, so hoffe ich doch dadurch etwas zur genauen Kenntniß desselben beigetragen zu haben, ausserdem es noch nicht ganz entschieden ist, ob nicht dennoch eine dieser lichtgelben Spielarten, gleichwohl der *Sc. testaceus* Fabr. seyn könne.

Die

a) Wiederholt in dem System. Eleutherat. T. I. n. 17. p. 26.



Die mir, ausser den in des Herrn Prof. Hellwigs zu Braunschweig Sammlung befindlichen Abstufungen, bekannten Spielarten, die ich zum theil auch selbst besitze, sind folgende:

Das Männchen ändert ab durch seine verschiedene Grösse, durch Kopf, Bruststück, Flügeldecken: schwarz, dunkelbraun, dunkelgelb, lichtgelb.

Das Scheitelhorn lange, sehr kurz, höckerartig.

Das Weibchen ausser seiner verschiedenen Grösse, ist schwarz, braun, dunkelgelb, glänzend: das Bruststück rückwärts der Länge nach ausgerieft, an beyden Seiten ein brauner Punkt, vorwärts eine kurze erhabene Längslinie, zwey fast unmerkliche erhabene Punkte. Zahnspißen an den vordern Schienen braun.

Bleich oder lichtgelb: am Scheitel zwey Höcker.

Ockergelb: das Bruststück vierhöckericht, die beyden mittlern fast verwachsen: statt des Höckers eine dreyeckigte spitzige Schuppe.

Ockergelb: das Bruststück vierhöckericht: die Höcker ansehnlicher, die mittlern ungemein nahe aneinander, doch nicht verwachsen.

Keineswegs glaube ich die Zahl möglicher Abstufungen ausgefüllt, oder die Stufenreihe derselben vollständig hier erreicht zu haben. Mir genüge nur das, was ich selbst gesehen, getreu bemerken zu können.

Wenn ich indessen nur eine lichtbraune Abänderung hier vorgestellt zu haben, nun glauben muß, so hielte ich es doch meiner gegenwärtigen Absicht nicht für zu weit entlegen und entfernt, wenn ich bey Untersuchung der Mundtheile, mich nicht ausschließlich an diese Abänderung band, vielmehr solche, nach der schwarzen Urart sowohl des Männchens als des Weibchens, im steten Vergleich dieser gelben Abart, vornahm. Ich wünschte sehr, daß es auch andern Entomologen, die sich auf das gewiß sehr angenehme, und durch sich selbst belohnende Geschäft der Untersuchung der Mundtheile verstehen, gefällig seyn

sehn mögte, diese meine Beobachtungen zu wiederholen und zu prüfen. Die von mir bemerkten ungewöhnlich verschiedenen beyden Kinnladen, die membranlosen Kinnbacken, die viergliedrigten hintern Freßspitzen geben allerdings Resultate an die Hand, deren Dignität bey Würdigung des stehenden Charakters der Gattung *Scarabaeus*, unter welche dieser *mobilicornis* gebracht worden, allerdings von großer Erheblichkeit zu sehn scheint. Ich habe zehn vollständige Exemplar dieser Beobachtung aufgeopfert, und in allen, solche übereinstimmend gefunden.

Noch ist ein Umstand an dieser Käferart übrig, den ich um eine reifere Prüfung zu veranlassen, nicht übergehen will.

Durchgehends führt dieselbe bekanntlich den Beynamen *mobilicornis*, den man von einer merkwürdigen Eigenheit, welche dieser Art fast ausschließlich eigen soll abgeleitet, und die man in unserer Sprache, mit dem Namen Wafelhorn, und wie ich glaube, nicht sehr pertinent zu verfinnlichen gesucht hat. Es soll nemlich dieselbe das Vermögen haben, das auf dem Scheitel stehende Horn, freywillig, und nach eigenem Gutdünken zu bewegen. Eine Eigenheit, die wenn sich solche ganz buchstäblich erweislich machen ließe, allerdings höchst merkwürdig sehn müste. Nur scheint es mir, als wenn man darauf, daß dieses Horn nicht wie bey ähnlichen, mit dem Kopfschild ein Continuum ausmache, sondern sich gleichsam durch eine Charniere, ohne den Kopfschild mit zu bewegen, bewegen ließe, zu viel gebauet, und dadurch sich verleiten lassen zu glauben, auch der Käfer sey im Stand dieses eigenbeweglich zu bewerkstelligen. Allein es dürfte demohngeachtet dieser Voraussetzungen, dieser Schluß noch immer seines Erweises bedürffen. Abgerechnet, daß doch noch keine glaubwürdigen Nachrichten vorhanden, daß man dieses seltsame Manövre wirklich und unbefangen vorurtheilsfren gesehen habe, so glaube ich annehmen zu dürfen, daß wenn dieser Käfer, diese in Frage gesetzte Eigenschaft wirklich an sich hätte, er nothwendig auch diejenigen Werkzeuge, nemlich Muskeln oder Sehne haben müsse, wodurch er, nach eigenen Belieben, die vor, oder rückwärts sich erstreckende Bewegung seines Hornes, bewerkstelligen könne. Die etwa mögliche Einwendung, daß dergleichen zu dieser Selbstbewegung erforderliche Werkzeuge, vielleicht dennoch da, nur unsern Augen verborgen seyn könnte, wird sich von dem leicht widerlegen lassen, welcher in

der Absicht, solche aufzusuchen, sich der Zergliederung dieser Theile unterzieht. Ich gestehe ganz unumwunden meinen Unglauben, an diese so oft nachgeschriebene Sage, und bin der Meinung, daß dieselbe vor der Hand, wenn dieser Käfer in der europäischen Fauna von dem seel. Göze wäre beschrieben worden, dieselbe von ihm, in das Kapitel der physikalischen Irrthümer würde gesetzt worden seyn.

Auf der siebenten Kupfertafel ist vorgestellt worden, und zwar ben

Fig. 1. das Männchen des *Scar. mobilicornis*  $\beta$  *elytris flavis* in natürlicher Größe

2. dieses vergrößert
3. eben daselbst vergrößert im Profil
4. das Bruststück samt dem Kopfschild und dem darauf sitzenden Horne rückwärts gezeichnet.
5. das Weibchen eben desselben in natürlicher Größe
6. dieses vergrößert
7. das Bruststück samt dem Kopfschild mit seinem Höcker.





## GEOTRVPES IPHICLVS.

## Der Iphiclus.

Tab. VIII. Fig. I.

GEOTRVPES *Iphiclus*: thoracis cornu incurvo basi utrinque unidentato, capitis recurvo ante apicem obtuse dentato.

<i>Mensurae.</i>		unc.	lin.
Longitudo a capite ad anum		2	: 6 $\frac{1}{2}$
cornu capitis		—	: 9 $\frac{1}{3}$
thoracis		1	: 5
cornu thoracis		—	: 7
elytror.		1	: 5

Clypeus brevis ater, apice obtusus, integer, utrinque sinuato emarginatus. Capitis cornu porrectum, oblique adscendens, recurvum, glabrum, nitens, thoracis longitudine, apice obtusum, et ante apicem obtuse dentatum. Oculi globosi fusci. Antennae nigrae: articulo primo longissimo, reliquis subaequalibus, ultimis tribus lamellatis. Thorax ater nitens laevis, marginatus, margine laterali punctato, antice excisus, margine integro; margine utrinque subrotundato; postice obsolete subsinuatus, desinens in cornu subulatum acutum incurvum, basi obtuse bidentatum. Scutellum triangulare atrum. Elytra convexa marginata glauca laevia glabra, longitudine abdominis, apice gibba, punctis maculisque sparsis nigris. Sutura nigra. Pedes nigri: tibiae anticae acute tridentatae, dente tertio remoto, apice spina acuta: mediae et posticae inaequaliter subdentatae, apice spinis duabus, altera minori. Tarsi elongati atrii quinquearticulati. Femora atra clavata nitida. Corpus subtus fuscum hirtum.



Habitat in India orientali. Museum academic. Erlangense.

Der Kopfschild ist kurz, schwarz, vorwärts stumpf, ungespalten, an beiden Seiten buchtig ausgeschnitten, stark herfürstehend, in schiefer Richtung sich in die Höhe richtend, rückwärts gebogen, glatt, glänzend, so lange als das Bruststück, an der Spitze stumpf, und vor, oder an der Spitze stumpf gezähnt. Die Augen sind kuglicht, glänzend und braun. Die Fühlhörner sind schwarz. Das erste Gelenk ist am längsten, die übrigen einander ziemlich gleich, und die drey letzten lamellenartigen formiren die geblätterte Keule. Das Bruststück ist schwarz, glänzend, eben, gerandet, am Seitenrande punktiert, vorwärts stark ausgeschnitten, und ungetheilt, an beiden Seiten rundlicht, hinwärts fast unmerklich ausgerandet. Vorwärts verlängert sich dasselbe in ein ziemlich langes, pfriemenförmiges, etwas vorwärts gekrümmtes glattes Horn, das an seiner Basis mit zwey stumpfen Zähnen versehen ist. Das dreyeckichte Schildchen ist schwarz. Die Flügeldecken sind gewölbt, gerandet, grünlicht-grau, eben, glatt, so lange als der Unterleib, an ihrem Ende bukkicht, und mit hie und da zerstreut stehenden schwarzen Punkten und Flecken gezeichnet. Die Naht derselben ist schwarz. Die Füße sind schwarz. Die Vordersehenbeine haben drey spitzige Zähne, von welchen der dritte etwas entfernt von den vordern steht, und sind an der Spitze mit einem etwas gekrümmten Stachel bewehrt. Die mittlern und hintern sind ungleichartig doch fast unscheinbar gezähnt, und an ihrem Ende mit zwey Stacheln versehen, von welchen der eine etwas kürzer als der andere ist. Die Fußblätter sind ziemlich lange, schwarz, und fünfgliedricht. Die Schenkel sind schwarz, glänzend und keulenförmig. Der Unterleib ist braun und fleischfarbig.

Das Vaterland dieses schönen und seltenen Geotrupen ist ohne Zweifel Indien. Herrn Prof. Fabricius scheint er noch unbemerkt geblieben zu seyn. Das Exemplar, nach welchem die auf der achten Kupfertafel vorgestellte Zeichnung entlehnt worden, befindet sich in dem akademischen Museum zu Erlangen, woher ich dasselbe zu diesem Gebrauche durch die Güte des verehrungswürdigen Vorstehers gedachten Musäi erhalten habe.

## GEOTRVPES ALCIDES.

## Der Alcide.

Tab. VIII. Fig. 2.

GEOTRVPES *Alcides*: thoracis cornu incurvo subtus barbato unidentato, capitis recurvato mutico. FABRIC. System. Eleutherat. T. I. n. 2. p. 3. Entom. syst. Supplem. n. 2. p. 8.

SCARABAEVS *Alcides*. FABRIC. Spec. Inf. T. I. n. 2. p. 4. Mant. Inf. T. I. n. 2. p. 3. Entom. syst. T. I. n. 2. p. 3.

SCARABAEVS *Alcides*. Oliv. Inf. L. 3. 7. 2. tab. I. fig. 2.

		Unc.	Lin.
<i>Mensurae.</i>	Longitudo a capite ad anum	2	: 2
	cornu capitis	—	: 6
	thoracis	—	: 11
	cornu thoracis	—	: 4
	elytror.	1	: 3

Clypeus marginatus ater brevis glaber nitens, antice subretusus, utrinque subsinuatus. Capitis cornu thorace brevius, suberectum, recurvum, obtusum, glabrum, nitens. Oculi fusci globosi nitidi hamo muniti. Antennae ferrugineae. Thorax marginatus ater nitens, antice excisus, margine laterali subrotundatus, utrinque ciliatus, postice integer. Dorsum elevatum, margine punctatum, antice in cornu acutum incurvum, subtus barbatum, fornicatum basi utrinque obsolete dentatum, desinens. Scutellum atrum laeve triangulum. Sutura nigra. Elytra convexa marginata longitudine abdominis, margine laterali medio subexcisa, apice gibbo obtusa, glauco-virescentia, nitida, glabra, maculis punctisque sparsis nigris. Pedes nigri nitidi. Tibiae anticae acute tridentatae, apice spina solitaria: mediae et posticae inaequaliter denta-



dentatae, apice spinis duabus. Femora nigra nitida clavata. Tarsi longiusculi, ad genicula utrinque fetosi, quinquearticulati. Corpus subtus fuscum hirto fetosum.

Habitat in India orientali. Museum academ. Erlangense.

Der Kopfschild ist gerandet, schwarz, kurz, glatt, glänzend, vorwärts so ziemlich abgestumpft, und an beiden Seiten einigermaßen buchtig ausgeschnitten. Das auf demselben stehende Horn ist kürzer als das Bruststück, steht einigermaßen gerade in die Höhe, ist an seiner Spitze rückwärts gekrümmt, mehr stumpf als spitzig, glatt und glänzend. Die Augen sind braun, glänzend, kugelförmig und mittels eines vom Bruststück angehenden Hackens gleichsam befestigt. Die Fühlhörner sind rostfarbig. Das Bruststück ist gerandet, schwarz, glänzend, vorwärts ausgeschnitten, am Seitenrande zugerundet, daselbst gefranzt, hinterwärts aber ungetheilt. Der Rücken ist stark gewölbt, am Rande punktiert, und vorwärts mit einem spitzigen etwas sich vorwärts neigenden Horne bewafnet. Dieses ist unterwärts ausgetieft, bartig, und an seiner Basis mit zwei fast unmerklichen Zähnen besetzt. Das Schildchen ist schwarz, eben und dreieckig. Die Naht ist schwarz. Die Flügeldecken sind gewölbt, gerandet, so lange als der Unterleib, an der Mitte des Seitenrandes etwas eingetieft, an der Spitze bucklicht und stumpf, grünlicht, grau, glänzend, glatt, und mit hie und da zerstreut stehenden schwarzen Punkten und Flecken gezeichnet. Die Füße sind schwarz und glänzend. Die Vordersehenbeine sind spitzig dreizählig, und an ihrem Ende mit einem etwas gebogenen kurzen Stachel bewafnet. Die mittlern und hintern sind ungleichartig gezähnt, und mit zwei Stacheln an ihrer Endspitze bewehrt. Die Schenkel sind schwarz, glänzend und keulförmig. Die Fußblätter ziemlich lange, an ihren Gelenkfügungen an beiden Seiten borstig, und fünfgliedrig. Der Körper ist unterwärts braun und steifhärigt.

Das Vaterland dieses Alcids ist Ostindien. Aus dem akademischen Museum zu Erlangen, mir gefälligst nebst dem vorigen mitgetheilt.

Daß

Daß dieser *Geotrupes* der nämliche Akebe des Herrn Prof. Fabricius  
sey, ist wohl nicht zu bezweifeln. Ob der Oliviersche *Perseus* hieher gehöre,  
kann ich nicht entscheiden, da ich dieses Werk hierüber nachzusehen, nicht Ge-  
legenheit habe.

Auf der achten Kupfertafel ist derselbe bey Fig. 2. in natürlicher  
Größe vorgestellt.

## GEOTRVPES HERCVLES Femina.

## Das Weibchen des Herkules.

Tab. VIII. Fig. 3. 4.

GEOTRVPES *Hercules femina*. FABRIC. System. Eleuther. T. I. n. 1. p. 2.SCARABAEVS *scaber*: scutellatus clypei centro prominulo, elytris antice scabris. LINN. Syst. Nat. n. 37. p. 549. ed. XIII. n. 37. p. 1549. Mus. Lud. Vlr. n. 15. p. 17.SCARABAEVS *ater opacus*, thorace mutico elytrisq.ue rugosis: capite clypeato emarginato, cornu minimo. GRONOV. Zooph. T. II. n. 422. p. 143. tab. XV. fig. 9. 10.SCARABAEVS *Hercules femina*. DRYVY Inf. exot. T. I. p. 112. tab. 30. fig. 2. ed. nostr.

	Unc.	Lin.
<i>Mensurae.</i> Longitudo a capite ad anum	2	—
capitis	—	$4\frac{1}{2}$
thoracis	—	$7\frac{1}{2}$
elytror.	1	3

Clypeus ater opacus angulatus, apice emarginatus subreflexus, subtus rufo pilosus, punctatus, vertice tuberculo corniformi brevi obtuso. Oculi globosi nitidi nigri. Antennae nigrae. Thorax fuscus antice opacus, postice nitidulus, nudus utrinque marginatus: dorso punctis plurimis elevatis scaber: subtus margine laterali, utrinque fusco ciliatus. Scutellum triangulare atrum glabrum. Elytra basi et ultra medietatem fusco-nigra, scabra, apice glabra, obscure virescentia, substriata, marginata: margine laterali ante apicem utrinque subsinuata, apice angustiora, medio latiora, longitudine abdominis. Striae in singulo elytro tres, apicem non attingentes, interiectis plurimis punctis elevatis in series

series positis, striis obsoletioribus interdum coalitis, intercurrentibus, interdum lineolis transversalibus inclusis, saepius liberis. Apice punctis plurimis elevatis sparsis. Quae omnia in elytro multa magnitudine aucto, et sub nr. 4. seorsim picto clarius ac distinctius oculis subiiciuntur, quam descriptione assequi possunt. Pedes nigri glabriusculi nitidi: tibiae anticae tridentatae, apice spinosa acuta valida: mediae et posticae inaequaliter bidentatae, apice spinis duabus. Femora nigra nitida clavata. Tarsi nigri quinque-articulati pubescentes. Corpus subtus fuscum pilosum.

Habitat in America meridionali.

Der Kopfschild ist schwarz, glanzlos, eckigt, vorwärts ausgerandet, daselbst einigermaßen zurückgeschlagen, punktiert, unterwärts rothbraun haricht, und auf dem Scheitel mit einem stumpfen hornartigen Höcker besetzt. Die Augen sind fuglicht, glänzend und schwarz. Die Fühlerhörner sind schwarz. Das Bruststück ist braun vorwärts ohne Glanz, hinterwärts einigermaßen glänzend, unbehaart, an beyden Seiten gerandet, auf dem Rücken durch viele erhabene Punkte rauh, und unterwärts an beyden Seiten braun gefranzt. Das Schildchen ist dreyeckicht, schwarz, glatt. Die Flügeldecken sind an der Basis und bis über die Mitte hinaus dunkelbraun, daselbst rauh, gegen ihr Ende zu glatt, dunkelgrünlicht, einigermaßen gestreift und mit einem Rande versehen. An ihrem Seitenrande sind sie gegen ihre Spitze zu, an beyden Seiten sanft ausgeteilt, daselbst schmaler, an ihrer Basis desto breiter, und so lange als der Unterleib. Streifen bemerkt man auf jeder drey, die aber nicht bis an die Spitze reichen. Zwischen dieser liegen mehrere erhabene Punkte in fast regelmäßigen Längereihen, zwischen welchen minder beträchtliche öfters zusammenfließende Längestreifen hindurch laufen, und die zuweilen durch kleine Querstreife durchkreuzt werden, so daß die Punkte nicht selten in kleinen Vierecken stehen: gegen die Spitze zu stehen die Punkte alsdann, wenn die Streifen aufhören, frey und unbegrenzt. Dieser Umstand läßt sich indessen an der bey 4, auf dieser Kupfertafel mit sehr starker Vergrößerung angebrachten einzelnen Flügeldecke weit anschaulicher und deutlicher bemerken, als durch eine

M 2

noch



noch so wortreiche Beschreibung versinnlichen. Die Füße sind schwarz, ziemlich glatt und glänzend. Die Vordersehenbeine sind dreizählig und an ihrer Spitze mit einem etwas gebogenen Stachel bewafnet: die mittlern und hintern sind ungleichförmig zweizählig, und an der Spitze mit zwey Stacheln bewehrt. Die Schenkel sind schwarz, glänzend, keulenförmig. Die Fußblätter schwarz, zartbärtig und fünfgliedericht. Der Unterleib ist braun und haarig.

Das Vaterland dieses Geotrupen ist das südliche Amerika — und dieses müßte auch angenommen werden, wenn sich die zwar an sich ziemlich wahrscheinliche Vermuthung bestätigen sollte, daß dieser Käfer, das Weibchen des bekannten Herkuleskäfers seyn sollte.

In Ermanglung bestätigender Nachrichten, konnte ich nicht umhin, die gegenwärtige, wenigstens nachzusagen, weil es mir an hinreichenden Beweisen fehlt, solche gehörig zu widerlegen. Die Analogie, die sonst zwischen dem Männchen und Weibchen bey ähnlichen Arten, den Erweis der richtigen Beurtheilung des Genus zu suppliren pflegt, kommt meinem Bedünken nach hier nicht sehr zu statten. Es ist, so viel ich weiß, ganz ungewöhnlich, daß Weibchen sich durch so sehr abweichende Flügeldecken, von den Männchen auszeichnen, wenn ich auch auf den hier allerdings mitsprechenden Habitus keine Rücksicht nehme. Ich wage es daher nicht vorschnell hierüber abzusprechen.

Auf der achten Kupfertafel ist dieser Geotrupes bey

Fig. 3. in natürlicher Größe abgebildet, und bey

4. eine Flügeldecke in einer stark vergrößerten Zeichnung am gebracht.



## ONITIS BISON.

## Der Bison.

Tab. IX. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. Mas. Tab. X. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Femina.

ONITIS *Bison*: exscutellatus thorace antice mucronato, capite cornubus duobus lunatis. FABRIC. System. Eleutherat. T. I. n. 7. p. 28.

SCARABAEVS *Bison*. FABRIC. Syst. Entom. n. 91. p. 23. Spec. Inf. T. I. p. 115. p. 26. Mant. Inf. T. I. n. 131. p. 14. Entom. syst. T. I. n. 164. p. 50.

SCARABAEVS *Bison*: exscutellatus, thorace antice mucronato, vertice capitis cornubus binis lunaribus. LINN. Syst. Nat. n. 27. p. 547. ed. XIII. n. 27. p. 1526.

SCARABAEVS *Bison*. OLIV. Inf. I. 3. 120. 140 tab. 6. fig. 43.

— — — — — ROSSI Faun. etrusc. T. I. n. 25. p. 12. et edit. Hellwig. T. I. p. 12.

— — — — — HERBST. Naturg. d. Käf. T. II. tab. 15. fig. 6.

		Mas.				Femina.		
<i>Mensurae.</i>	Longitudo a capite ad anum Lin.	9	:	8	:	$7\frac{1}{2}$	:	7
	clypei	$2\frac{1}{3}$	:	$2\frac{1}{4}$	:	2	:	$1\frac{7}{8}$
	cornu	$1\frac{1}{3}$	:	$1\frac{1}{4}$	:	1	:	$\frac{2}{3}$
	thoracis	$4\frac{1}{2}$	:	$4\frac{1}{2}$	:	$3\frac{5}{8}$	:	3
	elytror.	$4\frac{1}{3}$	:	4	:	$3\frac{1}{2}$	:	3
Latitudo	clypei	$2\frac{1}{2}$	:	$2\frac{1}{2}$	:	$2\frac{1}{4}$	:	2
	thoracis	5	:	5	:	$4\frac{1}{3}$	:	$4\frac{3}{4}$
	elytror.	5	:	5	:	$4\frac{1}{3}$	:	$3\frac{3}{4}$

*Descriptio Maris.* Palpi quatuor: antici quadriarticulati, articulo primo minuto, secundo tertio longioribus, quarto cylindrico longissimo: omnibus glabris rufis nitidis. Maxilla cornea angulata apice truncata, glabra nitida rufa, margine laterali fetosa, ante apicem membrana semicirculari villosa spongiosa flava, alteraque marginali in lobum

lobum obtusum apice ciliatum excurrente. Mandibula e basi lata fusca cornea in membranam medio cartilagineam ferrugineam apice tenuiori subalbida ciliatam abit, ovato oblonga, externo margine integro, interno ciliato - fisso. Mentum corneum fuscum plurimis punctis excavatis opacum, transversum subquadratum, apice late et obtuse emarginatum, pilosum, ante apicem utrinque dentiforme excisum, inde attenuatum, antice medio foveola glabra. Palpi posteriores brevissimi triarticulati, undique setosi, articulo ultimo brevissimo: omnibus subovatis rufis: primis duobus punctis excavatis: tertio glabro. Labium cartilagineo - membranaceum flavescens, basi fornicatum, medio protensum, apice profunde emarginatum: laciniis divaricatis linearibus obtusis ciliatis, medio costa fusca. Labrum ferrugineum medio cartilagineum, apice pallido membranaceum, sublunatum ciliatum, medio costa cornea percurrente. Antennae ferrugineae glabrae nitidae, articulo primo longissimo: secundo subrotundo, reliquis patelliformibus subaequalibus, ultimis tribus lamellatis: primo maiori, tertio reliquis minori, clavam cinero villosam constituentibus. Oculi pallide fusci f. obscuro testacei, quoad maiorem partem sub clypeo latentes. Clypeus ater opacus, antice semilunatus, integer, subretusus, margine antico reflexo: antice lineola transversa elevata, interdum abbreviata obsoleta: vertice lamina elevata acuta, medio subreflexa, utrinque in cornu incurvum, reclinatum medio latissimum, apice subsinuatum, validum magnum, interdum breve spinae aemulum, acutum aut obtusum, desinens: postice lineola elevata breviori. Thorax ater marginatus laevis nitens, aut opacus, punctis plurimis excavatus, interdum oblitteratis, supra planus ad marginem lateralem convexus: margine laterali antico rotundato, postico utrinque sinuato: antice subtus fornicato retusus, supra in cornu, aut mucronem validum, mediocrem, minutum,

minutum, rectum aut apice reflexum, obtusum elongatus: postice ad futuram punctis duobus excavatus, et ante puncta longitudinaliter impressus: utrinque postice ad marginem lateralem foveola lata impressa. Elytra atra, interdum obscure aenea, subopaca, glabra, marginata, basi plana, medio dorso ad futuram convexa, apice gibba, longitudine abdominis, sub lente striata: striis in singulo 8 - 9 subtilissime punctatis: punctis ad apicem manifestioribus: margine laterali baseos utrinque excavato - reflexa. Pedes nigri, nitidi, nudi, hirti. Tibiae anticae obtuse aut obsolete tri - vel quadridentatae, altero margine ciliatae, apice obtuse mucronatae: mediae et posticae breves, externo margine inaequaliter dentatae, utrinque nudae aut setis rufis raris obsitae, apice oblique subtruncatae, subtus obtuse dentato emarginatae, spina brevi acuta. Femora omnia valida clavato - compressa, glabra, nuda, aut setis rufis raris obsita: media remota. Tarsi antici vix ulli: medii et postici quinquearticulati rufi utrinque setoso - ciliati: articulo primo longissimo glabro nitido supra plano. Corpus subtus atrum subopacum subnudum.

*Descriptio Feminae.* Instrumenta cibaria eadem ac in mare. Clypeus productior, elongatior, margine laterali angustior ac in mare: obtusus margine obsolete reflexus, integer, opacus: antice lineola brevi elevata, medio lamina subsinuata utrinque tuberculata, et pone hanc tuberculo obtuso corniformi: margo clypei posticus elevatus. Thorax ac in mare, absque productione antica corniformi, loco huius lineola elevata brevis: puncta postica ad futuram, obsoletiora, confluentia. Elytra ac in mare. Eadem pedum conditio. Tibiae anticae rarius atque obsoletius dentatae.

Variat



Variat *mas* magnitudine, nitore, corniculis validis, magnis reflexis, curvatis, brevibus mucroniformibus erectis.

Variat *femina* magnitudine, nitore, saepius obscure aeneo: carina clypei mox arguta, mox obsoleta.

Habitat in Hispania, Italia, Gallia: in stercore bovino degit.

Vier Fressspitzen: die vordern viergliedrig; das erste Gelenk sehr kurz, das zweite und dritte länger, das vierte am längsten; walzenförmig: alle sind glatt, rothbraun und glänzend. Die Kinnbacke ist hornartig, eckig, oben abgestumpft, glatt, glänzend, rothbraun, und, am Rande mit borstenartigen Härchen besetzt. An der Endspitze sitzt eine halbkreisförmige rauchhärige gelbe schwammichte Membrane, und seitwärts noch eine andere, die sich in einen stumpfen oben gefranzten Lappen verliert. Die Kinnlade ist braun hornartig, an der Basis breit, und geht von da in eine rostfarbige in ihrer Mitte knorpelartige Membrane über, die an ihrem zarten Ende weißlicht und gefranzt ist: sie hat einen eiförmig: länglichten Umriß, und ist an ihrem Aussenrande ungetheilt, an ihrem innern aber gefranzt, zerschlossen. Das Kinn ist hornartig, braun, glanzlos, mit vielen Hohlpunkten, breiter als lang, einigermassen viereckig, an der Spitze weit und stumpf ausgeschnitten, haarig, am Rande auf beyden Seiten zahnartig eingekerbt, so daß derselbe nach oben zu schmaler werden muß; vorwärts glatt grüßchenartig eingerieft. Die hintern Fressspitzen sind überaus kurz, dreigliederig, überall mit vielen borstenartigen Härchen besetzt: das letzte Gelenk ist ungemein kurz; alle sind röthlicht und fast rundlicht: die ersten zwey zeichnen sich durch Hohlpunkte aus, das dritte ist glatt. Die Lippe ist knorpelartig, membranös, gelblicht, an der Basis gewölbt, in der Mitte bucklicht vorgerückt, und an der Spitze tief ausgeschnitten: die Ausschnitte oder Lappen sind von gleicher Breite, stumpf, gefranzt, in der Mitte mit einem starken braunen Nerven, und sehr weit auseinandergesperrt. Die letzte ist rostfarbig, in der Mitte knorplicht, an der Spitze bleich, membranös, beynahe halbmondförmig, gefranzt, und in der Mitte mit einer hornartigen Rippe durchlaufen. Die Fühlhörner sind rostfarbig, glatt, glänzend, das erste Gelenk ist am längsten, das zweite ist ziemlich rund, die übrigen schüsselförmig

förmig beynahe gleichartig, die letzten drey sind blätterartig, von welchen das erste das größte, das dritte das kleinste ist; und in Gestalt eines graulich, haarichten Knöpschens über einander liegen. Die Augen sind glänzend, hell, braun, auch dunkelockerfärbig, und liegen dem größten Theile nach unter dem Kopfschild verborgen. Der Kopfschild ist schwarz, glanzlos, vorwärts halbmondförmig im Umrisse, nicht ausgeschnitten, einigermaßen zurückgestumpft, und am vordern Rande zurückgeschlagen. Vorwärts steht eine erhöhte Quereinlinie, die zuweilen sehr kurz und ganz unansehnlich ist: auf dem Scheitel ein höheres scharfes Blech, das in der Mitte beynahe zurückgeschlagen, und an beyden Enden sich in ein gekrümmtes, rücklingsgewendetes, in seiner Mitte sehr breites, an der Spitze einigermaßen ausgetieftes, großes, starkes Horn verliert: zuweilen ist dasselbe kurz genug, oft nur einem spitzigen, oder stumpfen Stachel ähnlich: hinterwärts befindet sich noch eine erhöhte nur um vieles kürzere Quereinlinie. Das Bruststück ist schwarz, gerandet, eben, glänzend, oder auch ganz glanzlos, mit vielen Höhlpunkten die zuweilen ganz verblichen sind, auf dem Rücken flach, am Rande herunter gewölbt: am vordern Seitenrande abgerundet, am hintern hingegen stark ausgeschnitten: vorwärts unterwärts gewölbt abgestumpft, oberwärts aber in ein starkes, mittelmäßiges, kleines, gerades, oder an der Spitze umgeschlagenes, stumpfes Horn verlängert, das manchmal auch nur einer unansehnlichen stachelartigen stumpfen Hervorragung ähnlich ist. Rückwärts in der Gegend der Nahe zu, befinden sich auf dem Bruststücke noch zwey, öfters auch zuweilen zusammenstießende Höhlpunkte, und vor denselben öfters sehr unansehnliche länglichte Eindrücke. Seitwärts stehen noch gegen den Seitenrand zu zwey ziemlich breite grubchenartige Vertiefungen. Die Flügeldecken sind schwarz, zuweilen dunkelmetallartig, beynahe ganz glanzlos, glatt, gerandet, an der Basis flach, gegen die Mitte der Nahe zu gewölbt, an der Spitze bucklicht, so lange als der Unterleib, unter dem Such, glatte gestreift; auf jeder einzelnen liegen 8 : 9 Streifen, die überaus fein punktiert sind, nur sind diese Punkte gegen die Spitze zu deutlicher. Am Seitenrande oben an der Basis sind sie noch ausgetieft zurückgeschlagen. Die Füße sind schwarz, glänzend, unbehaart, oder auch mit steifen Härchen besetzt. Die Vordersehenbeine sind bald stumpf, bald unmerklich drey : oder viermal gezähnt, am andern Rande gefranzt, und an der Spitze stumpf stachlicht. Die mittlern und hintern sind kurz, am äußern Rande ungleich gezähnt, oder an beyden Seiten ganz, kahl, oder nur hie und da mit einigen rothbraunen steifen Härchen besetzt,



fest, an der Spitze schief abgestumpft, unterwärts stumpf gezähnt: ausgerandet, und mit einem kurzen spitzigen Stachel bewehrt. Alle Schenkel sind stark, keulenförmig zusammengedrückt, glatt, kahl, oder mit einigen seltenen rothbraunen borstenförmigen Härchen besetzt. Die mittlern stehen in einiger Entfernung von einander. An den Vorderfüßen habe ich nie Fußblätter gesehen. An den mittlern und hintern sind sie röthlicht, an beyden Seiten borstenartig gefranzt und fünfgliedricht: das erste Gelenk ist von ganz ungewöhnlicher verhältnißmäßiger Länge, glatt, glänzend, und flach. Der Unterleib ist schwarz, glanzlos, und öfters ganz kahl, manchmal auch haaricht.

Das Weibchen zeichnet sich durch seine Fresswerkzeuge vor dem Männchen nicht aus. Der Kopfschild ist vorwärtsgedrängter, länger, an seinem vordersten Rande schmaler, als bey dem Männchen, stumpf, am Rande einigermassen aufwärts gebogen, ohne Ausschnitt, und ohne sonderlichen Glanz: vorwärts eine kurze erhöhte Querlinie, und hinter dieser ein etwas ausgeschnittenes Blech, das sich an beyden Enden in ein Höckerchen verliehrt, hinter welchen ein stumpfes hornartiges Höckerchen befindlich, das fast den Mittelpunkt an dem Bleche einnimmt. Auch der hintere Rand des Kopfschildes steht etwas in die Höhe. Das Bruststück ist gerade so wie bey dem Männchen, von gleichem Umrisse, nur fehlt die vordere hornartige Verlängerung, statt welcher eine kurze kielartige Erhöhung da ist. Die hintern beyden gegen die Naht zu stehenden Punkte rinnen fast zusammen. Die Flügeldecken haben eben so vor den des Männchens nichts auszeichnendes. Dieß gilt auch von den Füßen. Die Vordersehenbeine sind mit wenigen und stumpfen Zähnen gezähnt.

Das Vaterland des Bison sind die südlichen Gegenden unsers Welttheils, und daher, außer Spanien und dem südlichen Frankreich, auch Italien: die ersten Exemplare die ich erhalten, wurden in der Gegend um Florenz gesammelt. Höchstwahrscheinlich ist der natürliche und gewöhnliche Aufenthalt desselben, wie Rossi uns berichtet, im Kuhdünge.

Abänderungen ist, wie meine Dimensionen zu erkennen geben, dieser Bison schon rücksichtlich seiner verschiedenen Größe allerdings fähig. Ich hätte diese Angabe leicht, mit mehreren vermehren können. Auch in Rücksicht des Kopfschildes, und vorzüglich dessen Hörner, und Querlinien ändert derselbe sehr ab.

ab. Ich habe es bereits bemerkt, daß diese Hörner zuweilen sehr breit, stark, sehr merklich gewunden und rückwärts gewendet sind, öfters auch nur zu kurzen, geraden, stachelähnlichen Spitzen herabsinken. Dies nehmliche gilt auch von der Lamelle, an der diese Hörner sitzen: auch diese ist manchmal sehr ansehnlich, zuweilen dieses minder. Oefters haben einige Exemplare, vorzüglich der Weibchen, die ich zu sehen Gelegenheit gehabt, und zum theil noch habe, einen metallartigen Schimmer, welcher gar oft auch fehlt; ja nicht selten, fehlt auch an ganz schwarzen Exemplaren derselbe dergestalt, daß sie ganz glanzlos sind. Merkwürdig würde es immer bleiben, wenn es sich auch an dieser, wie an mehreren Arten der Gattung *Onitis* bestätigen sollte, daß die Vorderfüße keine Tarsen hätten. Ob ich gleich sehr viele Exemplare gesehen habe, so erinnere ich mich doch nicht, daß ich an denselben Tarsen wahrgenommen hätte. Ich halte übrigens diesen Umstand einer Berichtigung würdig.

Auf der neunten Kupfertafel ist das Männchen des Bison vorgestellt, und zwar bey Fig. 1. in natürlicher Größe

1. das Bruststück, zugleich mit dem Kopfschild seitwärts
3. eben dasselbe vorwärts, — beyde stark vergrößert
4. das nehmliche von einem kleinen Exemplare.
5. der complete Käfer — mit starker Vergrößerung.

Die Abbildung des Weibchens befindet sich auf der zehnten Kupfertafel, und zwar bey

Fig. 1. in natürlicher Größe

2. das Bruststück samt dem Kopfschild seitwärts von einer merkwürdigen Abänderung, woran der Metallglanz sehr sichtbar ist.
3. eben diese Theile vorwärts gezeichnet.



- Fig. 4. eben diese seitwärts, von dem nehmlichen Exemplar
5. eben diese vorwärts, von dem Exemplar bey Fig. 2., mit durchaus ansehnlicher Vergrößerung.
6. das vollständige Weibchen, stark vergrößert
7. ein Auge des Weibchens, das zuweilen auf seinen Facetten gestekt ist.



## COPRIS VACCA. Femina.

## Das Rühlein. Das Weibchen.

Tab. XI. Fig. 1. 2. 3. 4. Variet. roman. fig. 5. 6. 7. 8.

COPRIS *Vacca*: thorace aeneo acuminato, occipite spina erecta gemina.  
FABRIC. Syftem. Eleutherat. T. I. n. 70. p. 45.

SCARABAEVS *Vacca*. FABRIC. Syft. Entom. n. 101. p. 26. Spec. Inf. T.  
I. n. 126. p. 28. Mant. Inf. T. I. n. 143. p. 15. Entom. Syft. T. I.  
n. 179 p. 55.

SCARABAEVS *Vacca*: exscutellatus thorace inermi retuso, occipite spina  
erecta gemina. LINN. Syft. Nat. n. 25. p. 547. ed. XIII. n. 25. p. 1543.

COPRIS obscure aeneus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris  
rufis nigro maculatis. GEOFFR. Inf. T. I. n. 5 p. 90.

SCARABAEVS *Vacca*. HERBST. Naturg. d. Käf. II. n. 118. p. 194. fig. 3. 4.

SCARABAEVS *Vacca*. OLIV. Inf. I. 3. 128. 151. tab. 8. fig. 65.

SCARABAEVS *Vacca*. ROSSI Faun. etrusc. I. n. 28. p. 13. et edit. Hellw. I.  
p. 13.

COPRIS *Vacca*. ILLIGER Kugelann Inf. Preuf. I. n. 3. p. 40.

SCARABAEVS *Vacca*. PANZER Faun. Inf. germ. XII. 4.

— — — — — Eiusd. Entom. germ. I. n. 57. p. 14.

<i>Mensurae.</i>	Longitudo a capite ad anum Lin.	Fem.	Variet. rom.
		$4\frac{3}{4}$	$5\frac{1}{4}$
	clypei	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{2}$
	thoracis	2	2
	elytror.	2	$2\frac{1}{2}$
Latitudo	clypei	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{2}$
	thoracis	$2\frac{7}{8}$	3
	elytror.		
	1) basi	3	$3\frac{7}{8}$
	2) apice	2	$2\frac{1}{3}$



*Descriptio.* Palpi quatuor: antici quadriarticulati nigricantes glabri nudi: articulo primo minuto obtuso; secundo tertio subaequalibus subconicis, quarto clavato longo, apice rufescente. Maxilla basi lata cornea, medio angustata fusca subnuda, postice fusco-fetosa, apice ante insertionem palporum subdentata, membrana lunata, spongiosa ciliata terminali. Mandibulae pallidae, basi corneae, apice membranaceae obtusae, antice multifissae, postice integerrimae. Labium pallidum emarginatum membranaceum, cruribus gracilioribus. Palpi posteriores triarticulati nigricantes glabri fusco-fetosi: articulo primo minuto, secundo subtriangulo, tertio brevi obtusiusculo. Mentum subquadratum fuscum, plurimis setis rufis hirtum, apice emarginatum, medio canaliculatum, utrinque subconvexum. Labrum transversum pallidum membranaceum, antice truncatum, ciliatum. Antennae nigricantes subnudae, articulo primo petiolari longissimo, reliquis subrotundis, sexto in acetabuli formam ampliato, ad clavam, ex foliolis tribus superimpositis constantem, excipiendam. Clypeus antice fuscus, postice viridi aeneus, punctis plurimis elevatis, setisque numerosis flavis: margine subrotundus, antice emarginatus, utrinque reflexus: antice lineola elevata acuta; occipite lamina obscure cuprea elevata, utrinque obtuse subcornuta. Thorax viridi aeneus opacus, punctis elevatis papillofis plurimis, setisque flavis stipatis: utrinque marginatus, margine laterali postice sinuato-repandus; antice retusus, medio prominentia obsolete subemarginata; dorso subplanus medio canaliculatus, postico margine ad futuram rotundato, marginatus, margine laterali utrinque tuberculo nitido impresso. Elytra longitudine abdominis, submarginata, obscure testacea, punctis maculisque numerosis, tum discretis, tum confluentibus sparsis obscuro-aeneis; basi latiora, dorso subplana nitidula; punctata

to striata: striis in singulo 8 - 9, interstitiis elevato punctatis papillofis subpubescentibus: sutura viridi aenea impresso punctata: basi ad angulum externum subgibba. Pedes omnes fusci nitidi, flavo setosi, punctis papillofis plurimis. Tibiae anticae margine externo quadridentatae, dentibus tribus prioribus majoribus; margine interno integro; apice spina solitaria incurva: mediae et posticae triangulae, externo margine inaequaliter spinuloso - dentatae, utrinque setoso - ciliatae: apice spina solitaria. Femora omnia clavato - compressa, excavato - punctata, flavo - ciliata: antica crassiora validiora: media distantia. Tarsi breviusculi quinquearticulati fusci ciliati: medii et postici articulo primo reliquis longiori. Corpus subtus nitidum, obscure aeneum pubescens.

*Varietas romana.* Clypeus nudus fusco aeneus, integer: lamina occipitali subsinuata utrinque corniculo obtuso terminali. Thorax opacus fusco nigro aeneus, absque pube. Elytra flava punctis et maculis fuscis maioribus adspersa. Abdomen nitidum atro - aeneum calvum. Corpus maius vix pubescens.

Habitat in Germania, Italia, Gallia: degit tempore verno in stercore vaccino. Varietas romana, Romae indigena.

Variat magnitudine corporis, clypeiique corniculorum: colore thoracis viridi aeneo, obscure viridi aeneo.

Vier Fressspitzen. Die vordern viergliederricht, schwärzlicht, glatt, unbehaart. Das erste Gelenk klein, stumpf, das zweite und dritte einander ziemlich gleich, fast kegelförmig; das vierte keulensförmig, lang, an der Spitze rötlich. Die Kinnbacke hornartig, an der Basis breit, in der Mitte schmaler, braun, fast unbehaart, rückwärts mit braunen borstenartigen Härchen besetzt, an der Spitze vor der Einkerbung der Palpen etwas zahnartig, und mit einer halbmondförmigen, schwammichten gefranzten Membrane sich endigend. Die Kinnladen bleichfärbig, an der Basis hornartig, an der Spitze membranös, stumpf, vorwärts zerklüftet: gefranzt, hinterwärts ungetheilt. Die Lippe ist bleich,



bleichgelb, häutig, ausgeschnitten; die Ausschnitte sind ziemlich schmal. Die hintern Greifspitzen sind dreigliedericht, schwärzlich, glatt, braun fleißbehaart: das erste Gelenk ist äußerst klein, das zweite fast dreieckicht, das dritte kurz und ziemlich stumpf. Das Kinn ist beynahе viereckicht, braun, mit vielen rothbraunen steifen Härchen besetzt, an der Spitze ausgeschnitten, in der Mitte rinnenartig vertieft, und an beyden Seiten einigermassen gewölbt. Die Lefze ist breiter als lang, weißlicht, häutig, vorwärts abgestumpft, gefranzt. Die Fußhörner sind schwärzlich, fast unbehaart: das erste Gelenk ist am längsten, die übrigen beynahе rund, das sechste ist becherartig erweitert, um die aus drey Blättern bestehende Kolbe aufzunehmen. Der Kopfschild ist vorwärts braun, rückwärts metall: grün, hökspunktiert, und mit gelben borstenähnlichen Härchen besetzt. Am Seitenrande scheint er ziemlich zugerundet zu seyn: vorwärts ist er ausgeschnitten, und an beyden Seiten zurückgeschlagen. Auf dem Scheitel bemerkt man eine scharfe Querlinie, und hinter dieser eine schwärzlichte Längels, die sich an ihren beyden Endungen mit eben so vielen stumpfen fast hornartigen Höckern vertheilt. Das Bruststück ist metallischgrün, glanzlos, mit sehr vielen warzenartigen kleinen Punkten übersät, auf und zwischen welchen viele gelbe borstenartige Härchen sitzen: an beyden Seiten gerandet, am Seitenrande gegen die Flügeldecken zu geschweift: ausgeschnitten; vorwärts abgestumpft, oben mit einem an der Mitte herfür tretenden stumpfen fast doppelten Vorschuß versehen; auf dem Rücken ziemlich flach, in dessen Mitte eine kurze nicht ganz hinauf reichende eingetiefte Längelslinie befindlich: der hinterste an die Flügeldecken anstoßende Rand ist zugerundet, und mit einem unansehnlichen Aufwurfe versehen. An beyden Seiten steht ein glänzendes etwas eingetiefte Höckerchen. Die Flügeldecken sind so lange als der Unterleib, sind mit einem doch nicht sehr starken Rande versehen, dunkel ockerfärbig, mit zahlreichen dunkel bronzeartigen, bald einzeln stehenden, bald zusammenlaufenden Punkten und Flecken, die ohne Mitzung stehen, gezeichnet: an ihrer Basis sind sie breiter, am Rücken ziemlich flach, an der Basis seitwärts höckericht, und etwas glänzend; punktiertgestreift: 8, 9 Streifen auf jeder, deren Zwischenräume mit vielen warzenartigen Punkten ausgefüllt und mit zarten Härchen besetzt sind. Die Naht ist metallgrün, der Länge herunter hökspunktiert. Die Füße sind durchaus braun, glänzend, gelbbehaart, und mit sehr vielen warzenartigen Punkten besetzt. Die Vorderschienbeine sind auswärts vierzählig, die drey obern Zähne sind merklich am stärksten: einwärts sind sie zahnlos, und an ihrem Ende mit einem

seinem einfachen etwas gekrümmten Stachel bewehrt. Die mittlern und hintern sind dreieckigt, auswärts ungleich zart stachelartig, an beyden Seiten borstenartig gefranzt, und mit einer ähnlichen stachelartigen Spitze an ihrem Endpunkte besetzt. Die Schenkel sind keulartig, zusammengedrückt, höhlpunktirt, gelblich gefranzt. Die vordern sind stärker und dicker: die mittlern stehen entfernter von einander. Die Fußblätter sind äußerst kurz, fünfgliedericht braun gefranzt: an dem mittlern und hintern ist das erste Gelenk länger als die übrigen. Der Unterleib ist dunkel bronzeartig, glänzend und mit zarten Härchen besetzt.

Die römische Abänderung des Weibchens dieses Käfers ist um ein ansehnliches größer, und fast ganz ohne Härchen. Der Kopfschild dunkel metallfarbig, ohne Einschnitt: das am Hinterhaupte stehende Blech ist nur etwas ausgetieft, und hat an beyden Enden eine stumpfe nicht sehr ansehnliche höckerichte Erhabenheit. Das Bruststück ist glanzlos braunschwarz metallfarbig, ohne Härchen. Die Flügeldecken sind dunkelgelb, und mit ähnlichen bald größern bald kleinern braunen Punkten und Flecken gezeichnet. Der Unterleib ist glänzend schwarz, bronzeartig, und kahl.

Diese Käferart ist mit ihren beyden Geschlechtesverschiedenheiten, fast durch ganz Deutschland, und zwar in manchen Gegenden nicht selten zu Hause: auch in Frankreich und Italien wird sie häufig angetroffen. Ihr gewöhnlicher Aufenthalt ist der Ruhdüngr, in dem man sie im Frühlinge häufig, besonders auf vergichten Anhöhen, antreffen kann.

Ausser der verschiedenen Größe, und der bald mehr, bald minder ansehnlich erhöhten Hörnchen auf dem Kopfschilde, so wie ausser dem bald mehr, bald minder lebhaft grün, metallischen Glanze auf dem Bruststücke und dem Kopfschilde, erinnere ich mich nicht Abänderungen angetroffen zu haben, die es werth wären, hier erwähnt zu werden.

Indessen sind mir jedoch vor mehrern Jahren, mehrere Exemplare der weiblichen *Vacca* unmittelbar aus Rom zugesandt worden, die daselbst nicht sehr selten seyn soll, und die ich, wegen des mir damals allzusehr abweichend vorgekommenen Habitus, für eine eigene Art gehalten, und als solche auch auf

D

der



der Kupfertafel benannt habe. Allein bey einer genauern Untersuchung, und bey dem mit beyden vorgenommenen Vergleiche, habe ich keinen wesentlichen Unterschied zwischen dieser *var. rom.* und unsern einheimischen Exemplaren, wahrnehmen können. Doch auch diese Verschiedenheit, die ich zwischen diesen, etwa entdecken konnte, habe ich angegeben. Es wird nun darauf ankommen, ob man sie mit mir, gleich unerheblich, um eine besondere Art daraus zu erweisen, oder wenigstens als bemerkenswerth, anerkennen will.

Ich habe mit Vorbedachte, weil ich nur die weibliche *Vacca* hier vorgestellt habe, des Männchens nicht gedacht: auch bey der Beschreibung der Mund- und übrigen Theile, nur diese von jenen des Weibchens genommen.

Auf der eilften Kupfertafel ist das Weibchen dieser *Copris vacca* abgebildet, und zwar bey

- Fig. 1. dasselbe in natürlicher Größe seitwärts schreitend  
 2. eben dasselbe vorwärts  
 3. eben dasselbe im Profil mit ansehnlicher Vergrößerung  
 4. das Bruststück und der Kopfschild stark vergrößert  
 5. die gedachte römische Abänderung in natürlicher Größe, seitwärts gezeichnet  
 6. eben dieselbe in natürlicher Größe vorwärts schreitend  
 7. eben dieselbe mit starker Vergrößerung im Profile  
 8. das Bruststück samt dem Kopfschilde, wie bey Fig. 4, des Vergleichs halber vergrößert.

## COPRIS CARNIFEX.

## Der Scharfrichter.

T. XII. Fig. 1. 2. 3. Mas. Fig. 4. 5. 6. 7. Femina.

*COPRIS Carnifex*: thorace mutico angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo. FABRIC. Syfl. Eleuth. T. I. n. 84. p. 48.

*SCARABAEVS Carnifex*. FABRIC. Syfl. Ent n. 102. p. 26. Spec. Inf. T. I. n. 128. p. 29. Mant. Inf. T. I. n. 146. p. 15. Entom. system. T. I. n. 186. p. 57.

*SCARABAEVS Carnifex*: exscutellatus, thorae inermi plano angulato scabro, capitis cornu inflexo, corpore aeneo. LINN. Syfl. Nat. n. 22. p. 546. ed. XIII. n. 22. p. 1542.

*SCARABAEVS Carnifex*. GRONOV. Zoophyl. T. III. n. 450.

*SCARABAEVS Carnifex*. OLIV. Inf. I. 3. 135. 161. tab. 6. fig. 46. tab. 10. fig. 86.

*SCARABAEVS Carnifex*. HERBST Naturg. d. Käf. II. tab. 15. fig. 4. 5.

*SCARABAEVS Carnifex*. DRURY Inf. I. p. 131. tab. 35. fig. 3. 4. 5.

*LIGICEPS aureus noveboracis*. VOET. Coleopt. T. II. p. 21. tab. 26. fig. 31. 32.

		Mas.	Fem.
<i>Mensurae.</i>	Longitudo a capite ad anum lin.	9 : 8	lin. 10 : $9\frac{1}{2}$
	capitis	$2\frac{3}{4}$ : 2	$2\frac{1}{2}$ : $2\frac{1}{4}$
	cornu	$3\frac{3}{4}$ : 3	
	thoracis	4 : $3\frac{1}{2}$	4 : $3\frac{3}{4}$
	elytri	$4\frac{1}{2}$ : $3\frac{1}{2}$	5 : 4
	Latitudo capitis	3 : $2\frac{1}{2}$	$3\frac{2}{3}$ : $3\frac{1}{4}$
	thoracis	5 : $4\frac{1}{2}$	6 : $5\frac{1}{4}$
	elytrorum	5 : $4\frac{3}{4}$	6 : $5\frac{1}{8}$

*Descriptio Maris.* Palpi inaequales filiformes: anteriores quadri-articulati, nudi glabri ferruginei; articulo primo minuto subcylindrico obtuso: secundo et tertio subaequalibus conoideis, apice pallidis: quarto longo clavato: adhaerentes extimo lateri maxillae. Maxilla cornea elongata, dorso fusco-atro setoso, ad insertionem palporum subdentata; apice membrana spongiosa suborbiculata pallide fusca, margine ciliata. Labium antico medio menti affixum, breve, membranaceum, bipartitum: cruribus pallidis apice obtusis. Palpi posteriores pone labii crura inserti, glabri ferruginei, triarticulati: articulo primo minuto basi setoso, secundo subcylindrico, tertio clavato. Mandibula, seu magis huius rudimentum, membranae palati adpressum, fornicatum, pallidum, basi fuscum, corneum, apice diaphano-membranaceum obtusum, antice multifissum. Antennae novemarticulatae ferrugineae, glabrae, nudae: articulo primo longissimo subangulato, 2. 3. 4. 5. subaequalibus rotundatis, sexto in acetabuli formam ampliato, ad clavam flavescentem, ex articulis 7. 8. 9. superimpositis membranaceis concavis constantem, excipiendam. Clypeus subtus rufo ciliatus, integer, antice depressus, semilunatus, margine laterali undique parum retusus: obscure aeneus, transversim aurato-striatus, glaber, nitidus: postice seu in regione occipitali, elevatus, ibidemque cornu nigro glabro parum reflexo subobtusulo terminatus, cuius varia longitudo, secundum variam individuorum magnitudinem, diversa deprehenditur. Mox enim aequat thoracem, saepe illum superat, et haud raro vix eundem attingit. Vtrumque ab eiusdem basi lata, linea elevata ad marginem lateralem extimum recta decurrit, spatio pone relicto, in cuius summo margine viridi aurato, oculi rotundati fusci protuberant. Thorax inaequalis, margine laterali angulato sinuatus, subreflexus, dorso medio depresso-subexcavatus, antice in planitiem subtrigonam, postice



postice in angulos tres, quorum acutiusculus medius desinens. Bicolor est. Regio dorsalis auri ad instar candefacti rubore fulgidissima, lateribus utrinque autem viridibus ex aureo resplendentibus. Superficies omnis scabra, ex punctis et rivulis undique confluentibus, tum elevatis tum impressis exasperata: foveola utrinque relicta. Praeter pubem raram atque brevem, qua margo lateralis fimbriatus, nulla adest. Elytra viridi-caeruleo aenea, abdomine breviora, dorso plana apice gibba, striis nitidis, interstitiis opacis: striis novem, suturae proximis et apicis argutis, baseos marginisque lateralis obsoletis: striarum singularum interstitium striis duabus vel angustioribus et depressioribus exaratum; iis suturae proxime adjacentibus elevatioribus; obsoletioribus autem illis, ad marginem lateralem sitis. Apex summus parum sinuato-exciscus, ibidemque subferrugineus. Abdomen obscure viridiaeneum nitidum glabrum: ano laeto viridi aeneo subpunctato. Pectus obscure aeneum villis rufis hirtum. Femora valida, crassa, clavata, rufo ciliata: antica obscuro aenea, media et postica lactiora, nitidiora. Tibiae anticae obscuro aeneae, extus obsolete tridentatae: mediae et posticae aequae obscurae, triangulae, rufo ciliatae, utrinque spinosae. Tarsi nigri obscuro rufo ciliati. Alae rufae.

*Descriptio Feminae.* Fabrica, forma, circumscriptio corporis, colorumque lusus omnino marem aequant: neque autem statura et magnitudo. Palporum et reliquorum instrumentorum cibariorum conditio eadem mihi visa est ut in mare. Clypeus subinteger, planior, utrinque obscure auratus, medio tenia lata obscura: occipite lineola angusta brevi transversa elevata, utrinque subcornuta. Thorax antice lineola transversa atra prominula, maris circumscriptione, planitieque dorsali minus excavata. Elytra tum coloribus, tum sculptura maris similia,



nisi latiora et regione dorsali magis planâ. Extremitatum artuumque eadem conditio ac in mare, exceptis tibiis anticis, in femina obtusius et obsoletius dentatis.

America borealis patria est: e Noveboraco, Pensylvania, Marylandia, Virginia et Carolina potissimum adfertur.

Das Männchen hat vier ungleichförmige fadenförmige Fressspitzen. Die vordern sind viergliedericht, glatt, kahl, und rostfärbig. Das erste Gelenk ist sehr kurz, stumpf, und einigermaßen walzenförmig. Das zweite und dritte ist fast gleichförmig, kegelförmig, und an der Spitze weißlicht; das vierte ist lang, keulenförmig. Diese Fressspitzen sind es, die rückwärts auf der Kinnbacke, oder vielmehr, an dem äußersten Rande derselben befestiget sind. Die Kinnbacke, gedeckt von dem Rinne, ist hornartig, so ziemlich verlängert, auf dem Rücken schwarzbraun borstig, und an dem Sitze der Fressspitzen, einigermaßen gezähnt. An ihrer Spitze steht eine bleichbraune fast kreisrunde schwammichte Membrane, die an ihrem Rande sehr fein gefranzt ist. Die Lippe ist vorwärts an der Mitte des Kinns angeheftet, kurz, membranös und zweitheilig oder gespalten. Die Schenkel sind weißlicht und stumpf. Die hintern Fressspitzen, stehen hinter den Schenkeln der Lippe, sie sind glatt, rostfärbig und dreigliedericht: ihr erstes Glied ist sehr klein, an der Basis borstig, das zweite beynähe walzenförmig, das dritte keulenförmig. Die Kinnlade, oder eigentlich nur ein unvollkommener Nasen derselben, liegt hart gedrückt an der Gaumenhaut (Lezge), ist gewölbt, weißlicht, an der Basis braun, daselbst hornartig, an der Spitze durchscheinend, membranös, stumpf, und am Vorderande vielspaltig. Die Fühlhörner sind neungliedrig, rostfärbig, glatt, kahl: das erste Gelenk ist am längsten und beynähe eckicht, das 2. 3. 4. und 5te sind einander so ziemlich gleich, rundlicht, das sechste ist becherartig oder pfannenförmig erweitert, um die braune, aus dem 7. 8. und 9ten Gelenke bestehende, und blätterartig übereinander liegende Keule, die sonach aus drey ausgehöhlten Membranen besteht, zu umschließen. Der Kopfschild ist unterwärts rothbraun gefranzt, ungespalten, vorwärts gleichsam abwärts gedrückt, halbmondförmig im vordern Umkreiße, am Seitenrande ringsherum etwas zurückgestumpft: dunkel bronze, in die Quere golden gestreift, glatt, glänzend. Hinterwärts oder in der Gegend des Occiputs hebt er sich in die Höhe, und daselbst steht auch das schwarze, glatte, etwas rückwärtsgebogene ziemlich stumpfe Hörnchen, dessen verschiedene



schiedene Höhe, nach der verschiedenen Eigenheit der Insektenduen auch verschieden angetroffen wird. Bald ist es mit dem Bruststück gleich hoch, bald ragt es über dasselbe hinaus, oftmals kommt es demselben gar nicht gleich. Eine erhöhte Längslinie schneidet von dessen breiter Basis zu beyden Seiten in gerader Richtung bis zu dem äußersten Seitenrand, läßt hinterwärts einen Raum, an dessen obersten Rande die braunlichten runden Augen hervorragen. Das Bruststück ist sehr ungleich: am Seitenrande ist es leicht ausgebogen, etwas zurückgeschlagen: in der Mitte auf dem Rücken ist es eingedrückt, ausgewölbt; vorwärts verläuft es sich in eine fast dreieckige Fläche, und rückwärts in drei Winkel, deren mittlerer am spitzigsten ist. Eigentlich hat es zwei sehr hervorstehende Farben. Auf dem Rücken glänzt eine Röthe wie glühendes Gold: die Seiten aber sind grün, mit einem zurückstrahlenden Goldschimmer. Die ganze Fläche ist rau, und scheint aus lauter Höhlenpunkten und Höhlstreifen, die immer und überall zusammenfließen, und zum Theil sich wieder erheben, geprägt zu seyn. Ein einzelnes Grübchen liegt auf beyden Seiten. Außer wenigen und kurzen Härchen, welche den Seitenrand befränzen, bemerkt man an demselben nichts haarichtes. Die Flügeldecken sind grünblau metallisch, kürzer als der Unterleib, auf dem Rücken flach, an der Spitze bucklicht, glänzend gestreift, zwischen glanzlosen Raumstreifen. Vieler Streifen kann man neun zählen, nur sind diejenigen, die zunächst an der Naht, und an der Spitze liegen scharfer kantig, diejenigen hingegen, die von der Basis herabkommen, und an den Seiten hinauffen flacher kantig. Jeder einzelne, zwischen diesen Streifen liegende Zwischenraum, wird abermals noch von zwei bald schmälern bald flacheren Strichen ausgefüllt: doch sind die der Naht zunächst liegenden scharfer kantig, die hingegen sich mehr dem Seitenrande nähernden, flacher oder fast unscheinbarer. Die äußerste Spitze der Flügeldecken ist einigermaßen ausgeschnitten, und daselbst ziemlich rostbraun. Der Unterleib ist dunkel grünmetallisch, glänzend, glatt; der After ist hellgrün, metallisch, punktiert. Die Brust ist dunkelmetallisch, rothbraun, haaricht. Die Schenkel sind stark, dick, keulenförmig, rothbraun gehaart: die vordern dunkelmetallisch, die mittlern und hintern heller, glänzender. Die Vordersehenbeine dunkelmetallisch, auswärts stumpf dreizählig: die mittlern und hintern eben so dunkel, dreieckicht, rothbraun gefranzt, an beyden Seiten dorsspitzig. Die Fußblätter schwarz, dunkelrothbraun gefranzt. Die Fügel röthlicht.

Bei dem Weibchen trifft Bau, Umriss und Farbenspiel wie bei dem Männchen vollkommen zu, nur weicht es in der Statur und Größe von demselben wieder ab.



ab. Greifwerkzeuge und was dazu gehört, ganz das nehmliche. Der Kopfschild fast ohne allen Ausschnitt, nur flacher, an beyden Seiten dunkelgoldnen, in der Mitte mit einem breiten schwärzlichten Flecken. Rückwärts liegt auf demselben eine kurze erhabene Querstreife, die an jedem Ende sich in ein Höckerchen hebt. Das Bruststück hat vorwärts eine schwarze erhabene Querlinie, im übrigen den nehmlichen Umriß wie bey dem Männchen: auch ist die Rückenfläche weniger ausgetieft. Die Flügeldecken sind sowohl der Farbe als der Sculptur nach, dem Männchen überaus ähnlich, nur daß sie breiter, und auf dem Rücken flacher sind. Die nehmliche Uebereinkunft mit dem Männchen, findet auch in Ansehung der Füße statt, nur daß die Vorderschienbeine an dem Weibchen stumpfer gezähnt sind.

Der *Carnifex* mit seinem Weibchen ist, nach dem Zeugnisse glaubwürdiger Nachrichten, ursprünglich in dem nördlichen Amerika zu Hause. Dieses bestätigen auch die Zusendungen mehrerer Exemplare derselben in die europäischen Kabinete. Aus Neu-York, Pensylvanien, Maryland, Virginien und Karolina kamen größtentheils diejenigen her, welche ich zu sehen Gelegenheit gehabt habe. Aus einer dieser Gegenden erhielt ich selbst mehrere wohlbehaltene Paare. Indessen glaube ich doch nicht undeutliche Spuren zu besitzen, wornach man annehmen könnte, das nördliche Amerika seye, und sonach gedachte Gegenden, nicht das ausschließende Vaterland des *Carnifex*: ich will indessen noch nichts gewisses hierüber bestimmen, bis sich ein mehreres hierüber ergibt.

Der Aufenthalt desselben ist, höchst wahrscheinlich der seiner Gattungsgenossen, in dem Auswurf der Thiere. Wahrscheinlich hat er auch die der sogenannten Pillenkäfer gewöhnliche Eigenschaft an sich.

Auf der zwölften Kupfertafel ist derselbe abgebildet, und zwar bey

- Fig. 1. das Bruststück samt dem Kopfschilde des Männchens in natürlicher Größe
2. eben dasselbe außerordentlich vergrößert, um so wie bey
  3. das Scheitelhorn deutlich zu bemerken.
  4. Das Weibchen in natürlicher Größe
  5. dieses stark vergrößert
  6. das Bruststück samt dem Kopfschilde vorwärts gestellt, und dieses bey
  7. im Profile vergrößert:

# Zeige

der auf den gegenwärtigen zwölf Kupfertafeln abgebildeten Käferarten.

\* Weil während die Kupfertafeln bereits gestochen, und abgedruckt worden, die unter selbige gesetzte Benennungen der darauf vorgestellten Käferarten eine sehr beträchtliche Veränderung erlitten haben, und es nicht flüchtig angienz, diese ältern Namen zu ändern, so werden solche hier gegenwärtig nach der Nomenclatur des *Syst. Eleutherator. Fabric.* angegeben.

Tab. I.

Fig. 1. 2. 3. 4. LUCANUS *Dama*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 249.

Tab. II.

Fig. 1. 2. 3. 4. 5. } *PASSALUS cornutus* Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3.  
p. 256.

*PASSALUS distinctus* Weber. observ. entom. n. 2. p. 79.

6. 7. 8. . : *PASSALUS interruptus* Fabric. Syst. Eleuth. T. II. D. I.  
p. 255.

## Tab. III.

Fig. 1. 2. LUCANUS *caraboides*, Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 23.  
p. 253.

3. 4. 5. LUCANUS *tenebroides*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 21.*  
p. 252.

## Tb. IV.

Fig. 1. 2. 3. 4. GEOTRUPES *Satyrus*. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 49.  
p. 15.

Tab. V.

Fig. 1. 2. 3. 4. SCARABAEUS *quadridens*. Fabric. Syst. Eleuth. T.I. n. 6.  
p. 23.

5. 6. 7. 8. *ATEUCHUS pilularius*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 27.*  
p. 60.

Tab. VI.



## Tab. VI.

- Fig. 1. 2. GEOTRUPES *monodon* Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 55.  
p. 17.
3. 4. 5. ATEUCHUS *Sacer*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 54.
6. 7. ATEUCHUS *laticollis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2.  
p. 55.

## Tab. VII.

- Fig. 1. 2. 3. 4. SCARABAEUS *mobilicornis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I.  
n. 7. p. 24.

## Tab. VIII.

- Fig. 1. GEOTRUPES *Ipbiclus*.
2. GEOTRUPES *Alcides* Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 3.
3. 4. GEOTRUPES *Hercules fem.* Fabric. Syst. Eleuth. T. I.  
n. 1. p. 3.

## Tab. IX.

- Fig. 1. 2. 3. 4. 5. ONITIS *Bifon* Mas. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 28.

## Tab. X.

- Fig. 1. 2. 3. 4. 5. ONITIS *Bifon*. Fem. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7.  
p. 28.
6. 7.

## Tab. XI.

- Fig. 1. 2. 3. 4. COPRIS *Vacca* Fem. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 70.  
p. 45.

- Fig. 5. 6. 7. 8. COPRIS *Vacca* Fem. Varietas.

## Tab. XII.

- Fig. 1. 2. 3. 4. COPRIS *Carnifex* Mas. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 84.  
p. 48.

- Fig. 5. 6. 7. 8. COPRIS *Carnifex* Fem.
-

## Index

## Coleopterorum Tab. I — XII delineatorum.

\* Quum, post tabulas iam iam excusas, nomina coleopterorum in iis delineatorum, haud exiguum mutationem vi systematis exigent, neque commode fieri potuisset, ut horum emendatio, deletis antiquioribus nominibus institueretur, nunc eorum recensio perfectior, secundum *Systema Eleutherator. Fabric.* in hoc indice traditur.

## Tab. I.

Fig. 1. 2. 3. 4. *LUCANUS Dama. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 249.*

## Tab. II.

Fig. 1. 2. 3. 4. 5. { *PASSALUS cornutus Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3. p. 256.*  
                                   { *PASSALUS distinctus Weber. observ. entom. n. 2. p. 79.*  
 6. 7. 8. . . . *PASSALUS interruptus Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 255.*

## T. III.

Fig. 1. 2. *LUCANUS caraboides. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 23. p. 253.*  
 3. 4. 5. *LUCANUS tenebroides. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 21. p. 252.*

## Tab. IV.

Fig. 1. 2. 3. 4. *GEOTRUPES Satyrus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 49. p. 15.*

## Tab. V.

Fig. 1. 2. 3. 4. *SCARABAEUS quadridens. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 23.*  
 5. 6. 7. 8. *ATEUCHUS pilularius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 27. p. 60.*

Tb. VI.



## Tab. VL

- Fig. 1. 2. GEOTRUPES *monodon* Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 55.  
p. 17.
3. 4. 5. ATEUCHUS *Sacer*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 54.
6. 7. ATEUCHUS *laticollis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2.  
p. 55.

## Tab. VII.

- Fig. 1. 2. 3. 4. SCARABAEUS *mobilicornis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7.  
p. 24.

## Tab. VIII.

- Fig. 1. GEOTRUPES *Iphiclus*.
- 2 GEOTRUPES *Alcides* Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2 p. 3.
3. 4. GEOTRUPES *Hercules* fem. Fabric. Syst. Eleuth. T. I.  
n. 1. p. 3.

## Tab. IX.

- Fig. 1. 2. 3. 4. 5. ONITIS *Bison* Mas. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 28.

## Tab. X.

- Fig. 1. 2. 3. 4. 5. ONITIS *Bison* Fem. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7.  
p. 28.
6. 7.

## Tab. XI.

- Fig. 1. 2. 3. 4. COPRIS *Vacca* Fem. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 70.  
p. 45.

- Fig. 5. 6. 7. 8. COPRIS *Vacca* Fem. Varietas.

## Tab. XII.

- Fig. 1. 2. 3. 4. COPRIS *Carnifex* Mas. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 84.  
p. 48.

- Fig. 5. 6. 7. 8. COPRIS *Carnifex* Fem.
-






Fig. 1. 2. 3. 4. *Lucanus Capreolus* Mas. Linn. Sp. 2. fig. 5. 6. 7. 8. *Femina*.  
*V. Bischoff ad nat. pinx. et exc.*



Fig. 1. 2. 3. 4. 5. *Lucanus interruptus* Mas. Linn. Sp. 4. fig. 6. 7. 8. Femina.  
 V. Bischoff ad nat. pinx. et exc.

Fig. 1



2



4



2



5



Fig. 12. *Lucanus caraboides* Linn. Sp. 7. Fig. 3. 4. 5. *Lucanus Tarandus*.  
N. B. Schöffer adnatpinx. et ex.



Fig. 1. 2. 3. 4. *Scarabaeus Satyrus* Fabric. Spec. Inf. 42.  
V. Bischoff ad nat. pinx. et exc.



Fig. 1. 2. 3. 4. *Scarabaeus Aeneas* Fig. 5. 6. 7. 8. *Sc. Geoffroae*. Geoffr. *Insp.* 8. p. 91.  
*V. Bichhoff* ad nat. pinx.



Fig. 1. 2. *Scarabaeus Talpa*. Fig. 3. 4. 5. *Sc. Sacer* Linn. Sp. 18. Fig. 6. 7. *Sc. Laticollis* Linn. Sp. 38.





Fig. 1, 2, 3, 4, *Scarabaeus testaceus* Mas. Fabric: Ent. syst. n. 83. 5, 6, 7 Feminae



Fig. 1. *Scarabaeus Iphiclus*, Fig. 2. *Scarab. Nödes*  
*Fabr. n. 2.* Fig 3. 4. *Scarab. marianus* Linn. n. 35.



Fig. 1



2



5



3



4



Fig. 1



7



Tab. X.

2



6



3



4




5



Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *Scarabaeus Bison* Femina Fabricius 1764.

Fig. 2.

Tab. XI.



3.



4.



8.



7.



Fig. 1, 2, 3, 4. *Scarabaeus vacca* Fabric: Ent. syst. n. 179 5, 6, 7, 8. *Scarabaeus romanus*.





Fig. 1. 2. 3. *Scarabaeus Carnifex* Mas Linn. n. 22. Fig. 4. 5. 6. 7. *Femina*.